# CATALOGUE

## RAISONNÉ

*DES Plantes, Arbres & Arbuſtes dont on trouve des Graines, des Bulbes & du Plant chez le Sieur* ANDRIEUX, *Marchand Grainier-Fleuriſte & Botaniſte du Roi.*

---

Commercium omne, deficiente communi linguâ, ceſſabit. *LINNÉ, Spec. plant.*

---

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
FONDS
LA SERNE
N° 19311
IMPRIMÉS

A PARIS,

CHEZ ledit Sieur ANDRIEUX, Succeſſeur du Sieur LEFEBVRE, Quai de la Mégiſſerie, à l'enſeigne du Roi des Oiſeaux & de la Renommée, ci-devant le Coq de la Bonne-Foi, près l'Arche-Marion.

M. DCC. LXXI.

8°Z le Senne 12.151 (1)

# M. DCC. LXXXI.

# CATALOGUE

DE

TABLEAUX,

DESSINS ET ESTAMPES

DES ÉCOLES D'ALLEMAGNE, DE FLANDRE, DE HOLLANDE, D'ANGLETERRE, D'ITALIE, D'ESPAGNE ET DE FRANCE,

DES TABLEAUX

DE LA GALERIE

DE FEU M. LE COMTE DE BRANCAS,

Dont la Vente se fera le Lundi 25 Février 1782, & jours suivans, à deux heures précises de relevée, dans la Maison de M. Remy, Huissier-Priseur, rue & vis-à-vis la Vieille Monnoie.

Cette Vente sera annoncée par affiches, & il en sera distribué des exemplaires.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 23 Février, jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Dimanche 24 Février, depuis dix heures du matin jusqu'à quatre heures de relevée.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 25 Février, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 26 Février, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 27 Février, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 28 Février, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 1 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 2 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 4 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 5 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 6 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 7 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 8 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 9 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 11 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 12 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 13 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 14 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 15 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 16 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 18 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 19 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 20 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 21 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 22 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 23 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 25 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 26 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 27 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 28 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 29 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 30 Mars, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 1 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 2 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 3 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 4 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 5 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 6 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 8 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 9 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 10 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 11 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 12 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 13 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 15 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 16 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 17 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 18 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 19 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 20 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 22 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 23 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mercredi 24 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Jeudi 25 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Vendredi 26 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Samedi 27 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Lundi 29 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

Les Tableaux & Dessins seront exposés le Mardi 30 Avril, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.

# AVIS.

Le Sieur Andrieux ayant à cœur de contenter le Public avec toute la fidélité dont il eſt capable, n'a négligé aucun ſoin pour rendre ce Catalogue le plus exact qu'il a été poſſible.

On y trouvera la liſte des Plantes utiles ou agréables dont il débite journellement les Graines, les Oignons & les Tubercules, & même du Plant ſoigneuſement élevé: on y verra la liſte des Arbres & Arbuſtes dont il fait habituellement des envois. Il a cru devoir s'en tenir là & ne pas faire mention de beaucoup d'autres Plantes plus précieuſes, dont le commerce n'eſt pas auſſi général. Les correſpondances qu'il tient, tant avec la Hollande, l'Angleterre & autres pays étrangers, qu'avec pluſieurs curieux du Royaume, le mettent à portée de ſatisfaire aux demandes qui lui ſeront faites ſur les objets les plus rares de la Botanique.

Pour éviter toutes mépriſes dans les envois, & pour ſatisfaire au deſir des amateurs, qui demandent depuis long-tems les noms latins de Botanique attachés aux noms françois de commerce; on a placé à chaque eſpèce dans une ſeconde colonne les noms latins que M. de Linné donne dans ſes ouvrages, & qu'il appelle à juſte titre les noms triviaux.

Lorſqu'on a été obligé d'ajouter un troiſième nom pour diſtinguer quelque *Race*, dont M. de Linné n'a point parlé, on a eu ſoin de le faire connoître par un caractère différent & plus

petit; ces noms, au reſte, ſont également connus & uſités. Mais il n'a pas paru convenable d'en fabriquer de nouveaux pour diverſes variétés annoncées dans la colonne françoiſe, parceque ſouvent ils n'auroient pas été ſignificatifs, & que n'étant pas connus, ils n'auroient été préférables en rien aux noms françois vulgaires, même pour les étrangers, que l'on a eu principalement en vue dans ce travail.

On a de plus eu ſoin de mettre à chaque eſpèce, ſuivant l'uſage des Marchands Hollandois & de tous les Botaniſtes, des marques qui indiquent la durée des plantes. Le ſigne du Soleil ☉ déſigne les *Plantes Annuelles*, qui naiſſent & meurent dans une ſeule révolution de la terre autour du Soleil; le ſigne de Mars ♂ déſigne les *Plantes Biſannuelles*; celui de Jupiter ♃ les *Plantes Vivaces*; & le ſigne de Saturne ♄ les *Arbres* ou *Arbuſtes*, dont la durée de la vie égale ou ſurpaſſe celle de la révolution de cette planette.

Mais on fera obſerver que quand il ſe trouve des ſignes avant & après le nom françois, ceux qui le ſuivent déſignent toujours la durée réelle ou phyſique de la plante; & que ceux qui ſont en marge ont rapport à leur durée utile.

Pour ne rien laiſſer à deſirer à ceux qui ſe fourniront de graines chez le Sieur Andrieux, on a mis, à la ſuite de ce Catalogue, des obſervations par forme de calendrier ſur le tems de les ſemer, & un détail plus circonſtancié ſur la manière d'établir les prairies artificielles & quelques autres grandes cultures nouvellement introduites dans ce pays.

CATALOGUE

# CATALOGUE
## RAISONNÉ
### *Des* GRAINES, *BULBES & PLANTS qu'on trouve chez le Sieur* ANDRIEUX.

## I. RACINES POTAGERES.

⊙ Le Salsifis blanc — *Tragopogon porrifolium.*
♂ la Scorsonaire ou Salsifis d'Espagne — *Scorzonera hispanica.*
♄ le Topinambour — *Helianthus tuberosus.*

Ce sont les tubercules mêmes des racines que l'on vend pour planter au printems.

⊙ la Carote rouge ♂ — *Daucus Carota.*
la Carote jaune
la Carote blanche
♄ le Cheruis — *Sium Sisarum.*

On en vend aussi du plant d'un an au printems.

⊙ le Panais ♂ — *Pastinaca sativa.*
⊙ le Celeri-rave — *Apium graveolens* dulce.
♄ la Morelle-truffe, — *Solanum tuberosum.*

Elle s'appelle vulgairement à Paris Pomme-de-terre, à Lyon Truffe, Patate en Angleterre, Crampir en Allemagne. Ce sont ses tubercules qu'on plante au printems.

⊙ le Navet ; ♂ de la graine de *Brassica Napus.*
Vaugirard, de Meaux, de Freneuse, de Belleville & autres.
le Navet printannier, graine de Strasbourg.
⊙ la Rabioule ou grosse rave ♂ *Brassica Rapa.*
⊙ le Raifort, ou gros radis noir d'hiver ♂ *Raphanus sativus* major.
le Radis noir d'été & d'automne
le Radis blanc *Raphanus sativ.* rotundus
le petit Radis rond hâtif
le Radis rouge & rond hâtif
la Rave de corail *Raphanus sativ.* oblongus
la petite Rave hâtive
la Rave couleur de rose
⊙ la Beterave rouge ♂ *Beta vulgaris.*
la Beterave de Castelnaudari
la Beterave jaune *Beta vulgaris* lutea.
⊙♂ la Raiponce *Campanula Rapunculus.*

## II. PLANTES BULBEUSES POTAGERES.

⊙ Le Poireau ♂ *Allium Porrum.*
♄ l'Ail *Allium sativum.*
On n'en vend point de graines, mais des gousses pour replanter.
♄ la Rocambole *Allium Scorodoprasum*
Ce sont les bulbes qui naissent dans sa tête, qu'on vend & qu'on nomme improprement ses graines.
⊙ l'Oignon rouge ♂ *Allium Cepa.*
l'Oignon pâle
l'Oignon blanc
le petit Oignon blanc de Florence

l'Oignon d'Eſpagne
♄ l'Echalotte ; du plant. *Allium aſcalonicum.*
⊙ la Ciboule ♂ *Allium fiſtuloſum.*
♄ la Ciboulette ou Civette, *Allium Schænopraſum*
point de graine, mais du plant.

## III. VERDURES ET GROSSES PLANTES POTAGERES.

♄ L'Aſperge d'Aubervilliers *Aſparagus officinalis.*
la vraie Aſperge de Hollande

On en vend auſſi du plant de toutes deux depuis Février juſqu'en Mai.

♄ le gros Artichaud de Laon *Cynara Scolymus.*
l'Artichaud violet

On en trouve auſſi du plant de Février en Mai.

le petit Artichaud de Provence
⊙ le Cardon de Tours ♂ *Cynara Cardunculus.*
le Cardon d'Eſpagne

Et du plant des deux en Mai, Juin & Juillet.

⊙♂ le Chou-cavalier *Braſſica oleracea viridis.*
le Chou rouge *Braſſica oleracea rubra.*
le vrai Chou rouge de Hollande
le Chou d'hiver à groſſe côte *Braſſica oleracea capitata.*
le Chou pancalier
le Chou pommé de Saint-Denis
le Chou pommé de Bonneuil hâtif
le gros Chou pommé d'Alſace

| | |
|---|---|
| le gros Chou de Milan | *Braſſica oleracea ſabauda.* |
| le petit Chou de Milan | |
| le Chou de Savoie friſé & pommé | |
| le Chou pyramidal panaché | *Braſſica oleracea ſabellica.* |
| le Chou-fleur dur | *Braſſica oleracea botrytis.* |
| le Chou-fleur tendre | |
| le Chou-fleur d'Angleterre hâtif | |
| le Chou-fleur de Hollande | |
| le Chou-fleur d'Italie | |
| le Chou-fleur de Malthe | |
| le Chou-fleur de Chypre | |
| le Chou Brocolis blanc de Malthe. | |
| le Chou Brocolis violet de Malte | |
| le Chou-rave ou de Siam | *Braſſ. oleracea gongylodes* |
| le Chou-navet | *Braſſ. oleracea Napo-braſſica.* |

Outre toutes ces graines de Chou, le ſieur Andrieux fournira du plant de la plupart ſur-tout au printems & dans la ſaiſon propre à chacun.

| | |
|---|---|
| ⊙ l'Arroche ou Belledame | *Atriplex hortenſis.* |
| ⊙ la Poirée ♄ | *Beta Cicla* viridis. |
| la Poirée blonde à Cardes. | *Beta Cicla* alba. |
| ⊙ l'Epinar | *Spinacia oleracea.* |
| l'Epinar de Hollande ou gros Epinar | |
| ♄ l'Oſeille de Belleville. | *Rumex acetoſa.* |
| l'Oſeille vierge | *Rumex acetoſa* latifolia. |

On en vend du plant au printems & en Automne, mais point de graine ; car cette race des montagnes n'en porte point ici, les individus que nous avons étant tous femelles.

## IV. GRAINES LÉGUMINEUSES.

| | |
|---|---|
| ⊙ Le Haricot de Soiſſons | *Phaſeolus vulgaris.* |
| le Haricot ſans parchemin | *Phaſeolus nanus.* |
| le Haricot ſuiſſe noir. | |
| — le brun | |
| — le rouge | |
| — le blanc | |
| le Haricot nain de Hollande hâtif | |
| le Haricot nain de Laon hâtif | |
| ⊙ la Geſſe ou Lentille d'Eſpagne | *Lathyrus ſativus.* |
| ⊙ le Pois-michaud | *Piſum ſativum.* |
| le Pois-dominé | |
| le Pois couronné | |
| le Pois anglois | |
| le Pois de Marly | |
| le Pois-laurent | |
| le Pois de Clamart | |
| le Pois du mont Salvé | |
| le Pois ſans pareil | |
| le Pois quarré blanc | *Piſum ſativum quadratum.* |
| le Pois au cul noir | |
| le Pois ſans parchemin | |
| le Pois turc | |
| le Pois nain de Hollande | |
| le Pois nain à bouquet | *Piſum ſativum umbellatum.* |
| le Pois nain ſans parchemin | |
| le Pois vert normand | *Piſum ſativum* |
| ⊙ la Garvance, ou le Pois-chiche blanc | *Cicer arietinum.* |

| | |
|---|---|
| ⊙ la Fève de marais | *Vicia Faba* major. |
| la groſſe Fève de Windſor | |
| la petite Fève dite Julienne | *Vicia Faba* minor. |
| ⊙ la Veſce blanche ou Lentille de canada. | *Vicia ſativa* alba. |
| ⊙ la Lentille | *Ervum Lens.* |
| la Lentille à la reine | |

## V. SALADES ET FOURNITURES.

⊙ Les Laitûes pommées, ſavoir, *Lactuca ſativa* capitata.

la petite-Crêpe
la groſſe-Crêpe
la Gotte printaniere
la George
la Groſſe blonde
la Dauphine
la Perpignane
la Bapaume
la Batavia ou de Siléſie
la Mouſſeronne
la Savoie
la Groſſe-brune
la Petite-hollandoiſe
la Groſſe-blonde hollandoiſe
la Rouge
la Flagellée
la Coquille
la Paſſion
la Roulette rouge
la Roulette blanche
l'Italie
la Royale

| | |
|---|---|
| la Pareſſeuſe | |
| la Cocaſſe | |
| la Verſailles | |
| l'Impériale ou Allemande | |
| la Palatine | |
| la Sans-pareille | |
| & les Laitues à couper. | |
| la Laitue d'épinar. | *Lactuca ſativa* |
| les Laitues-romaines ou Chicons ; ſavoir, | *Lactuca ſativa* romana. |
| la Romaine d'hiver | |
| — la brune | |
| — la verte | |
| — la blonde | |
| — la panachée | |
| ⊙ la Chicorée ♂ | *Cichorium Endivia.* |
| la Chicorée de Meaux | |
| la Chicorée fine d'Italie | |
| la Scarole | *Cichorium Endivia* latifolia. |
| ⊙♄ la Chicorée ſauvage | *Cichorium Intybus.* |
| — la panachée | |
| ♄ l'Eſtragon, du plant. | *Artemiſia Dracunculus.* |
| ⊙ la Mâche commune | *Valeriana Locuſta* olitoria. |
| la Mâche d'italie ou de la Régence. | *Valeriana Locuſta* oblonga. |
| ♄ la Bacille ou Percepierre | *Crithmum maritimum.* |
| ⊙ le Cerfeuil | *Scandix Cerefolium.* |
| ⊙ le Fenouil à faire blanchir | *Anethum Fœniculum.* |
| ⊙ le Céleri plein | *Apium graveolens* dulce. |
| le Céleri couleur de roſe | |
| petit Céleri de Paris à couper. | |
| le Celeri-rave | |
| ⊙ la Bourache, pour ſes fleurs. | *Borago officinalis.* |
| le Naſitort ou Creſſon alénois. | *Lepidium ſativum.* |

le petit Nasitort frisé
le grand à feuilles d'oseille
☉ la Roquette — *Brassica Eruca.*
☉ la Balsamine. — *Impatiens Balsamina.*
Ses fleurs se mettent dans les salades.
☉ la Capucine — *Tropæolum majus.*
☉ la petite Capucine. — *Tropæolum minus.*
♄ l'Alleluia ou Oxalide — *Oxalis Acetosella.*
De la graine & du plant.
☉ la Corne-de-cerf ou le Coronope ♄ — *Plantago Coronopus.*
☉ le Pourpier — *Portulaca oleracea.*
☉♂ la Raiponce — *Campanula Rapunculus.*

On trouvera aussi dans le courant du printems & de l'été, du plant des meilleures Laitues & Romaines, de Chicorée & de Scarole.

## VI. PLANTES AROMATIQUES. POTAGERES.

♂ L'Angélique — *Angelica Archangelica.*
♄ Le Cerfeuil musqué. — *Scandix odorata.*
Sa graine étant longue à lever, on pourra en trouver du jeune plant d'un an.
♄ le Fenouil doux, ou Anis de Paris — *Anethum Fœniculum*
☉ l'Anis — *Pimpinella Anisum*
♄☉♂ le Persil
le gros Persil — *Apium Petroselinum.*
♄ le Romarin — *Rosmarinus officinalis.*
♄ la Sauge — *Salvia officinalis.*
♄ la Lavande — *Lavandula Spica.*
♄ la Marjolaine — *Origanum Majorana.*
♄ le Thim — *Thymus vulgaris.*
On vend aussi & plus communément du plant de ces cinq dernieres pour les bordures des potagers.

⊙ la Sarriette — *Satureia hortenſis.*
⊙ le grand Baſilic — *Ocimum monachorum.*
⊙ la Moldavique — *Dracocephalum moldavica*

On trouvera plus bas la recette du Ratafia qu'on fait de ſes fleurs.

♄ la Violette double, Du plant — *Viola odorata* plena.
⊙ la Nigelle aromatique ou l'Epicerie — *Nigella ſativa.*
♄ l'Œillet à Ratafia; — *Dianthus Caryophyllus.*
Graines & marcottes, ou des pieds ſuivant les ſaiſons.

## VII. FRUITS DE POTAGER.

⊙ Le Maïs ou Blé de turquie, dont les jeunes épis se mangent en cornichons. — *Zea Mays.*
⊙ le grand Chilé, Piment ou Poivre long — *Capſicum groſſum.*
⊙ la Mélongène ou Aubergine — *Solanum Melongena.*
⊙ la Tomate ou Pomme d'amour — *Solanum Lycoperſicum.*
⊙ le Giclet ou Concombre d'attrape, qui n'est que de curiosité. — *Momordica Elaterium.*
le Concombre jaune — *Cucumis ſativus.*
— le hâtif blanc
— le vert pour cornichons.
⊙ le Concombre-ſerpent. — *Cucumis flexuoſus.*
Il a trop peu de chair pour être fricaſſé; mais on en fait des cornichons.
⊙ le Melon-maraicher — *Cucumis Melo* vulgaris.
le Melon de Coulomier
le Melon des carmes, gros & petit
le Melon-langeais — *Cucumis Melo* striatus.
le Melon ſucrin de Tours — *Cucumis Melo* saccharatus.

| | | |
|---|---|---|
| | le Cantaloup plat & autres des meilleurs. | *Cucumis Melo* verrucosus. |
| ☿ | la Citrouille | *Cucurbita Pepo* oblongus. |
| | le Potiron | *Cucurbita Pepo* rotundus. |
| | le Potiron brodé | |
| | le Potiron vert | |
| | le Giraumon noir | *Cucurb. Pepo* americanus. |
| | — le blanc à verrues | |
| | le moucheté dit Citrouille de Barbarie, & autres des meilleurs. | |
| | le Paſtiſſon, Bonnet d'électeur, ou Artichaut de Jéruſalem | *Cucurbita Melopepo* |
| ⊙ | — le petit à bandes, de diverses formes. | |
| | le Pépon à verrues | *Cucurbita verrucoſa.* |
| ⊙ | les Giraumonets à bandes & ſans bandes | *Cucurbita ovifera.* |
| ⊙ | la Paſteque, ou le Melon d'eau | *Cucurbita Citrullus.* |
| | la Courge | *Cucurbita lagenaria.* |
| ⊙ | la Courge longue | *Cucurbita lagenaria* longa. |

C'eſt dans le nombre des Paſtiſſons, des Pépons & des Giraumonets que ſe trouvent tous ces fruits de montre qu'on garde pour la beauté, & qu'on nomme Oranges, Poires, Coloquintes, &c. &c.

## ☿ LES FRAISIERS, *ſavoir*:

| | |
|---|---|
| Le Fraiſier à fleurs ſemi-doubles, qui rapporte de bons fruits. | *Fragaria* silvestris multiplex. |
| le Fraiſier hâtif d'Angleterre, à élever sous chassis, | *Fragaria* silvestris minor. tant le rouge que le blanc. |
| le Fraiſier des mois, qui produit jusqu'aux gelées sans secours | *Fragaria* silvestris semper florens. |
| Le Fraiſier-buiſſon, qui ne produit point de coulans; | *Frag.* silvest. efflagellis. tant le rouge que le blanc. |

le Fraisier de versailles, *Frag.* silvest. monophylla.
qui a les feuilles simples & les queues des fruits feuillues.

## Les Breslinges ou Fraisiers verts; *Savoir :*

| | |
|---|---|
| Le Fraisier vert, d'Angleterre, | *Fragaria* pratensis viridis. |
| le Fraisier-brugnon de Suède. | *Fragaria* pratensis Linnæi. |
| le Fraisier-breslinge, de la Thuringe | *Fragaria* pratensis nigra. |
| le Fraisier de lonchamp | *Frag.* pratensis Vaillantii. |
| le Fraisier de bargemon | *Frag.* pratentis Cesalpini. |
| le Fraisier vineux, de Champagne | *Fragaria* prat. angulosa. |
| le Fraisier de mignone | *Fragaria* prat. granulosa. |

## les Caperoniers ou Fraisiers musqués; *Savoir :*

| | |
|---|---|
| Le Caperonier royal | *Fr.* moschata hermaphrodita. |
| le Caperonier framboisé, | *Frag.* moschata dioica. |

& autres variétés à fleurs semi-doubles, feuilles crépues, &c.

## les Quoimios ou Fraisiers d'amérique; *Savoir :*

| | |
|---|---|
| Le Fraisier écarlate | *Frag.* americana coccinea. |
| le Fraisier-ananas | *Frag.* americana ananassa. |
| le Fraisier de bath | *Frag.* americana Milleri |
| le Fraisier de caroline | *Frag.* americana lucida |
| le Fraisier-quoimio | *Frag.* americana tincta |
| le Frutiller, ou Fraisier du chili, à fruits de la grosseur d'œufs de poule. | *Frag.* chiloensis dioica. |
| le Frutiller royal | *Frag.* chiloensis hermaph. |

On trouvera toujours chez le ſieur Andrieux des graines des différens Fraiſiers rapportés ci-deſſus; mais il eſt plus prompt & plus sûr d'employer du plant dont il fournira les curieux; il avertit ſeulement que les Quoimios & les trois derniers Breſſinges dégénèrent beaucoup plus dans les ſemis que les Fraiſiers proprement dits & les Caperoniers. Il y a ſur-tout de l'avantage à ſemer les Fraiſiers hâtifs, les Fraiſiers-buiſſons & les Fraiſiers des mois. On avertit encore les cultivateurs que dans les Caperoniers élevés de graine, il ſe trouve toujours moitié de pieds mâles qui ſont ſtériles, mais ſans leſquels les femelles le ſont auſſi, à moins qu'on ne les plante mêlées avec du Caperonier royal, qui eſt hermaphrodite, & que le Frutiller a pareillement beſoin d'être joint ou au Frutiller royal ou au Caperonier royal, ou aux autres Quoimios, mais pour le mieux au Fraiſier-ananas qui fleurit dans ſa même ſaiſon *.

♃ le Framboiſier des Alpes, *Rubus idæus* alpinus.
qui porte du fruit en Juin, en Septembre & Octobre.

* M. Ducheſne, auteur de l'Hiſtoire naturelle des Fraiſiers, a bien voulu nous gratifier tant des graines que du plant des Fraiſiers ci-deſſus.

* *Fragariarum nomina trivialia a celeberrimo D. C. Linnæo non relata, cum seminibus ipsis ſeu radicibus vivis, a D. Ducheſne accepimus.*

## VII. FLEURS ET PLANTES DE CURIOSITÉ.

♃ Le Baliſier ou la Canne d'inde — *Canna indica.*
♃ l'Iris de Suze — *Iris ſuſiana.*
♃ l'Iris de Florence — *Iris florentina.*
♃ l'Iris odorant — *Iris ſambucina.*
♃ l'Iris panaché — *Iris variegata*
♃ l'Iris nain — *Iris pumila*
♃ l'Iris-hermodate — *Iris tuberosa*
♃ l'Iris bulbeux — *Iris Xiphium.*

| | |
|---|---|
| ℞ l'Iris de Perſe | *Iris perſica.* |
| ℞ le Safran | *Crocus ſativus officinalis.* |
| ℞ le Safran printanier, dit Crocus | *Crocus ſativus vernus.* |
| ℞ le Narciſſe jaune, ou Aïaut double. | *Narciſſus Pſeudonarciſſus.* |
| ℞ le Narciſſe blanc, ou la Jeannette, double | *Narciſſus poeticus.* |
| ℞ le Narciſſe blanc à bouquets, dit Totus albus. | *Narciſſus albus.* |
| ℞ le Narciſſe odorant, dit Soleil d'or | *Narciſſus Tajetta.* |
| ℞ le Narciſſe de Conſtantinople. | *Narciſſus orientalis.* |

Et tous ces mêmes Narcisses simples au compte & au boisseau.

| | |
|---|---|
| ℞ la Jonquille ſimple<br>la Jonquille double<br>la groſſe Jonquille de Caen | *Narciſſus Jonquilla* |
| ℞ l'Emérocale | *Hemerocallis flava.* |
| ℞ l'Emérocale orangée | *Hemerocallis fulva.* |
| ℞ la Greneſienne | *Amaryllis ſarnienſis.* |
| ℞ la Greneſienne belladonne | *Amaryllis Belladonna.* |
| ℞ le Lis | *Lilium candidum.* |
| ℞ le Lis orangé | *Lilium bulbiferum.* |
| ℞ le Martagon pomponien. | *Lilium pomponium.* |
| ℞ le Lis-émérocale | *Lilium chalcedonium.* |
| ℞ le Martagon | *Lilium Martagon.* |
| ℞ la Fritillaire impériale ou Couronne impériale | *Fritillaria imperialis.* |

De toutes ces plantes un grand nombre de variétés des plus belles.

| | |
|---|---|
| ℞ les belles Tulipes dénommées; en particulier | *Tulipa geſneriana.* |

la Tulipe odorante, dite Duc de Thol, qui fleurit en Janvier, Février & Mars, plantée en Octobre, Novembre & Décembre.

& les Tulipes communes au compte ou au boisseau.

♄ les Jacintes doubles de *Hyacinthus orientalis.* Hollande, distinguées par nom, de différentes nuances, bleues, blanches, rouges, violettes, pourpres, couleur de chair, jaunes, &c.

les Jacintes doubles, dites Civilis, Lionnaises & autres de Hollande sans nom, de toutes les couleurs.

les Jacintes simples, dites Passes tout de Hollande.

les Jacintes communes, au compte & au boisseau, & de la graine de ces Jacintes des plus belles.

On trouve aussi chez le sieur Andrieux des Jacintes & autres oignons ou fleuris en pot & en caraffe, ou avancés pour fleurir eu hiver.

| | |
|---|---|
| ♄ le Muscari | *Hyacinthus muscari* |
| ♄ la Scille ou Jacinte de mai | *Scilla amena.* |
| ♄ la Tubéreuse double | *Polyanthes tuberosa.* |
| la Tubéreuse simple | |
| ♄ l'Alpiste-roseau panaché, ou Ruban | *Phalaris arundinucea* picta. |
| ☉ la Larmière ou Larme-de-job | *Coix Lachryma jobi.* |
| ♄ le Roseau panaché ou grand Ruban | *Arundo Donax* picta. |
| ♄♂ la Catanance | *Catananche cœrulea.* |
| ☉ les Bluets ou Barbeaux de plusieurs couleurs. | *Centaurea cyanus.* |
| ☉ l'Ambrette rouge & blanche | *Centaurea moschata.* |
| l'Ambrette jaune ou Barbeau jaune | *Centaurea moschata Amberboi.* |
| ☉♂ la Sérante ou grande Immortelle. On en vend aussi du plant. | *Xeranthemum annuum.* |
| ♂ l'Obéliscaire | *Rudbeckia hirta.* |
| ☉ le Soleil ou Vosacan | *Helianthus annuus.* |
| ♄ le Soleil vivace ou petit Vosacan, du plant & non de la graine. | *Helianthus multiflorus.* |
| ☉ la Brésine ou Zinnia. | *Zinnia multiflora.* |

♄ la Coriope découpée : du plant. *Coreopsis tripleris* minor.
☉ la Tagète ou œillet d'inde *Tagetes patula*
☉ la grande Tagète ou Rose d'inde *Tagetes erecta*
♄☉ la Crisaine ou Chrysanthemum *Chrysanthemum coronarium.*

On vend au printems des boutures de la double, ce qui la conserve comme vivace.

♄ l'Aster, ou *oculus-christi* *Aster Amellus.*
& divers autres Asters plus rares.

☉ la Reine-marguerite-violette, gris de lin, rouge, couleur de chair, blanche, les mêmes panachées ; & les perites à pompons. *Aster chinensis.*

♄ la Santoline : & du plant. *Santolina Chama-cyparissias.*
☉♂ le Souci-double *Calendula officinalis.*
♄ l'Immortelle jaune : du plant *Gnaphalium orientale.*
♄ l'Aurone : du plant. *Artemisia Abrotanum.*
♄ la Valériane éperonnée *Valeriana rubra.*
♂☉ la Scabieuse odorante *Scabiosa atropurpurea*
♄♂ la Scabieuse-immortelle *Scabiosa stellata.*
♄ la Primevère, graine & plant *Primula veris.*
& du plant de celles à fleurs doubles.
la Primevère à bouquets *Primula veris elatior.*
des curieux (graines & œilletons)
♄ l'Auricule ou oreille-d'ours *Primula Auricula.*
& des œilletons des plus belles variétés.
le Ciclame *Ciclamen europeum.*
le Liseron des indes, dit Volubilis. *Convolvulus hederaceus.*
☉ la Belle-de-jour *Convolvulus tricolor.*
♄ la Polémoine ou Valériane grecque *Polemonium coeruleum.*
le Floxe *Phlox maculata.*
♄ la Digitale, graine & plant *Digitatis purpurea.*
☉♄ la Pervanche de Madagascar ♄ *Vinca rosea.*

| | | |
|---|---|---|
| ⊙♄ | l'Héliotrope du Pérou, ♄ des graines & des pieds en pot. | *Heliotropium peruvianum* |
| ⊙ | la Moldavique | *Dracocephal. Moldavica.* |
| ⊙ | le petit Basilic | *Ocimum minimum* |
| | le petit Basilic violet. | |
| | le Basilic à feuille d'ortie | *Ocimum Basilicum.* |
| | le Basilic à feuille de laitue | *Ocimum monachorum.* |
| ⊙ | le Taraspic blanc & le gris de lin. | *Iberis umbellata.* |
| ♄ | le Taraspic vivace | *Iberis sempervirens.* |
| ♄ | le Taraspic d'hiver | *Iberis semperflorens.* |
| ♄ | l'Alisse dorée ou Taraspic-jonquille | *Alyssum incanum.* |
| ♂ | la Barbarée ou Julienne jaune | *Erysimum Barbarea.* |
| ♄♂ | la Julienne. | *Hesperis matronalis.* |
| ♄ | la Julienne double : du plant | |
| ♂♄♄ | la Giroflée jaune | *Cheiranthus Cheiri.* |
| | la Giroflée jaune double des plus belles. | |
| ⊙ | la Quarantaine de différentes couleurs | *Cheiranthus annuus.* |
| | la Quarantaine greeque. | |
| ♄♂ | la Giroflée, les doubles de toutes sortes en pots ou en plant. | *Cheiranthus incianus.* |
| | la Giroflée royale blanche & rose | |
| ⊙ | le Pavot double : Plusieurs sortes de diverses couleurs. | *Papaver somniferum.* |
| ⊙ | le Coquelicot double De plusieurs couleurs | *Papaver Rhœas.* |
| ⊙ | la Balzamine double : De plusieurs couleurs. | *Impatiens Balsamina.* |
| ⊙ | la Balzamine jaune. | *Impatiens Noli-tangere.* |
| ♄ | l'Hépatique : Du plant des diverses sortes. | *Anemone Hepatica.* |

l'Anémone

♄ l'Anémone; de la graine & des pattes des plus belles variétés. *Anemone coronaria.*

♄ la Renoncule, graine & griffes des doubles & des semi-doubles des plus belles. *Ranunculus asiaticus.*

⊙ le Pied-d'allouette, ou la Delphinette double, de plusieurs couleurs. *Delphinium ajacis.*

♄ l'Aconit, graine & plant. *Aconitum Napellus.*

⊙ la Nigelle, ou le Cheveu de Vénus. *Nigella damascena.*

♄ la Fraxinelle, graine & plant. *Dictamnus albus.*

⊙♄ le Geranium ou la Géraine odorante ♄ *Geranium zonale.*

le même à feuilles panachées & autres variétés : de la graine des espèces qui en rendent, & du plant de toutes les variétés.

♄♄ la Grenadille, ou Fleur de la passion, graine & plant. ♄ *Passiflora coerulea.*

♄ le Mousselin, sorte de petit gazon à fleurs blanches, graine & plant. *Moerhingia muscosa.*

♂ l'Œillet-bouquet, ou Œillet de poëte : graine & plant des simples & des doubles. *Dianthus carthusianorum latifolius.*

♄ l'Œillet d'Espagne double, du plant. *Dianthus barbatus.*

⊙♄ l'Œillet de la Chine, double panaché de plusieurs couleurs. ♄ *Dianthus chinensis.*

♄ l'Œillet double piqueté, ou panaché : de la graine & des marcottes des plus belles varietés. *Dianthus Caryophyllus.*

⊙ le Muscipula *Silene Muscipula.*

♄ la Coronaire ou grande Coquelourde & du plant de la double. *Agrostemma Coronaria,*

♄ la Niquenique ou Véronique double; du plant. *Lychnis Flos cuculi.*

♄ la Bourbonnoise double, du plant. *Lychnis Viscaria.*

♄ la Licnide ou Croix de Jérusalem blanche & rouge & du plant des variétés à fleurs doubles. *Lychnis chalcedonica.*

| | | |
|---|---|---|
| ♄ | la Merveille, ou Belle de nuit | *Mirabilis Jalapa* |
| ♄ | la Merveille du Mexique : du plant. | *Mirabilis longiflora.* |
| ♄ | le Plantain-roſe | *Plantago major roſea.* |
| ☉ | l'Amarante à queue de renard | *Amaranthus caudatus.* |
| ☉ | le Tricolor | *Amaranthus tricolor.* |
| ☉ | l'Amarantoïde | *Gomphrena globoſa.* |
| ☉ | le Paſſe-velours ou Amarante à palme rouge & jaune | *Celoſia criſtata.* |
| ☉ | le Blit ou Epinar-fraiſe | *Blitum capitatum.* |
| ☉ | le Belveder | *Chenopodium Scoparia.* |
| ☉ | la Perſicaire du levant | *Polygonum orientale.* |
| ☉ | la Glaciale | *Mezembrianthemum cryſtallinum.* |
| ♂ | la Mauve en arbre | *Lavatera arborea.* |
| ☉♂♄ | la Paſſeroſe ou Roſe-tremière de toutes couleurs, & du plant d'un an. ♄ | *Alcea roſea.* |
| ☉♄ | la Senſitive : & des pieds en pots. ♂ | *Mimoſa pudica.* |
| ☉♄ | la Senſitive pareſſeuſe ♄ | *Mimoſa pernambucana.* |
| ☉ | le Haricot d'Eſpagne, & du plant. | *Phaſeolus vulgaris coccineus.* |
| ☉ | le Lupin panaché | *Lupinus varius.* |
| ☉ | la Geſſe odorante, ou le Pois d'odeur. | *Lathyrus odoratus.* |
| ♄ | la Geſſe, ou Pois à bouquet | *Lathyrus latifolius.* |
| ♂ | le Sainfoin d'Eſpagne | *Hedyſarum coronarium.* |
| ☉♄ | le Baguenaudier rouge ♄ | *Colutea fruteſcens.* |
| ♄ | l'Etépin, qui grimpe comme un haricot, repousse chaque année, & garnit les treillages les plus ombragés. | *Glycine monoica.* |
| ♄ | la Campanule | *Campanula perſicifolia.* |
| | la Campanule double : du plant. | |
| ♂ | la Pyramidale | *Campanula pyramidalis.* |
| ♂ | le Chambon ou Herbe aux ânes. | *Œnothera biennis.* |

⊙ la Cardinale — *Lobelia Cardinalis.*
⊙ la Cardinale bleue — *Lobelia ſiphylitica.*
⊙ le Giclet ou Concombre d'attrape — *Momordica Elaterium.*
⊙ le Ricin ou Palma-Chriſti — *Ricinus communis.*

On trouvera des graines de Gazons triées des meilleures eſpèces vivaces des bas prés, qui forment enſemble des tapis ſerrés, verts & durables, y compris le Rai-graſſ & le Fromental; ſavoir:

♄ la Flouve — *Anthoxanthum odoratum.*
♄ le Fromental — *Avena elatior.*
♄ l'Avenette blonde — *Avena flaveſcens.*
♄ l'Avenette argentée — *Avena pratenſis.*
♄ la Cretelle — *Cynoſurus criſtatus.*
♄ le Painvin — *Lolium perenne.*
⊙ l'Amourette tremblante — *Briza media.*
♄ la Poherbe des prés — *Poa pratenſis.*
♄ la Poherbe des bois — *Poa anguſtifolia.*
♄ la Poherbe des friches — *Poa trivialis.*

## VIII. ARBRES A FLEURS ET ARBUSTES.

La Buplèvre ou Séſeli d'Ethiopie — *Buplevrum fruticoſum.*
la Morelle-Ceriſette, dite Amomum — *Solanum Pſeudocapſicum.*
le Lilas — *Syringa vulgaris.*
l'Héliotrope du Pérou — *Heliotropium peruvianum.*

Pour faire lever cette graine, le mieux est de ne la point enterrer, mais de couvrir la terre de Mousse & de l'entretenir humide.

la Quetmie, dite Althæa frutex — *Hibiſcus ſyriacus.*
le Gaînier ou Arbre de Judée — *Cercis Siliquaſtrum.*

| | |
|---|---|
| le Genêt d'Eſpagne | *Spartium junceum.* |
| le Citiſe des Alpes | *Cytiſus Laburnum.* |
| le Baguenaudier | *Colutea arboreſcens.* |
| l'Amorfiſe ou Indigo bâtard | *Amorpha fruticoſa.* |
| le Piracante ou Buiſſon ardent. | *Meſpilus Pyracantha.* |
| l'Aubépin, ou Epine blan- | *Cratægus Oxyacantha.* |
| le Cormier ou Sorbier | *Sorbus domeſtica.* |
| le Cochêne ou Sorbier des oiſeaux | *Sorbus aucuparia.* |
| le Sumac de Canada | *Rhus typhinum.* |
| le Tuyer ou Arbre de vie | *Thuya occidentalis.* |
| le Tuyer de la Chine | *Thuya orientalis.* |

## Arbres de Forêts, d'Avenues, ou de Jardins de propreté.

| | |
|---|---|
| Le Troêne | *Liguſtrum vulgare* |
| le Frêne | *Fraxinus excelſior.* |
| le Tilleul | *Tilia europea.* |
| le Tilleul de Hollande | *Robinia Pſeudo-acacia.* |
| l'Acacia | *Acer Pſeudo-platanus.* |
| l'Erable-ſicomore | *Acer Platanoides.* |
| l'Erable plane | *Acer Platanoides.* |
| le Charme | *Carpinus Betulus.* |
| le Hêtre | *Fagus ſilvatica.* |
| l'Orme | *Ulmus campeſtris.* |
| le Chêne | *Quercus Robur.* |
| l'Yeuſe ou Chêne-vert | *Quercus Ilex.* |
| le Mûrier blanc | *Morus alba.* |
| le Mûrier à la roſe | |
| l'If | *Taxus baccata.* |
| le Ciprès | *Cupreſſus ſempervirens.* |
| le Pin | *Pinus Pineas.* |
| le Pin de Hollande | *Pinus ſilveſtris.* |
| le Cèdre du Liban | *Pinus Cedrus.* |
| le Sapin | *Pinus Picea.* |
| le Sapin de Piémont | |

## IX. FOURAGES.

| | | |
|---|---|---|
| ♄ | La grande Maſſette ou Thimoty des Anglois. | *Phleum pratenſe.* |
| ♄ | le Fromental ou Rai-grass de Dom Miroudot (*a*) | *Avena elatior.* |
| ♄ | le grand Painvin ou Ray-grass d'Angleterre | *Lolium perenne.* |
| ♄ | la Poherbe de Virginie, Birds-grass, ou Graine d'oiseaux. | *Poa capillaris.* |
| ♄ | la grande Pimprenelle | *Poterium Sanguiſorba.* |
| ♄ | la Morelle-truffe | *Solanum tuberoſum.* |
| ☉ | la Guède ou le Paſtel ♂ | *Iſatis tinctoria.* |
| ☉ | la Rabioule, Turnep des Anglois, ou vraie Rave des Anciens. ♂ | *Braſſica Rapa.* |
| ☉ | la Spergule ♂ | *Spergula arvenſis.* |
| ♄ | l'Ajonc ou Jomarin ♄ | *Ulex europeus.* |
| ♄ | la Luzerne | *Medicago ſativa.* |
| | la Luzerne de Provence | |
| ♂ | la Lupuline, ou le Trefle noir ♂ | *Medicago lupulina.* |
| ♄ | le Trèfle de Hollande | *Trifolium pratenſe.* |
| ♄ | le Sainfoin | *Hedyſarum Onobrychis.* |

### AUTRES PLANTES DE GRANDE CULTURE.

| | | |
|---|---|---|
| ♄ | Le Saffran ; des oignons. | *Crocus officinalis.* |
| ☉ | l'Alpiſte | *Phalaris canarienſis.* |
| ☉ | le Sorgo | *Holeus Sorghum.* |
| ☉ | le Panis ou petit Millet | *Panicum italicum.* |
| ☉ | le Millet | *Panicum miliaceum.* |

(*a*) L'on ne tient point de graine de l'Orge ſauvage connu ſous le nom de *Riegraſſ* & *de faux Seigle*, *Hordeum murinum*, parce que ce fourage ne vaut rien.

| | |
|---|---|
| ⊙ le Soucrion, ou Orge nu | *Hordeum distichum nudum.* |
| ⊙ le Froment de Smirne ou Blé de miracle | *Triticum æstivum* palmatum. |
| ⊙ le Maïs ou Blé de turquie | *Zea Mays.* |
| ♄ la Garance | *Rubra tinctorum.* |
| ♄ la Soyeuse ou Ouatte | *Asclepias syriaca.* |
| ⊙ le Colsa | *Brassica arvensis.* |
| ⊙ le Lin de Riga | *Linum usitatissimum.* |
| ⊙ le Chanvre de Piémont | *Cannabis sativa* gigantea. |

## X. GRAINES D'USAGE EN NATURE,

*ou de diverses plantes médicinales, &c.*

| | |
|---|---|
| L'*Oignon* de Lis | *Lilium candidum.* |
| l'Alpiste | *Phalaris canariensis.* |
| la Larmière, ou Larme de Job | *Coix Lachryma Jobi.* |
| le *Gruau de Bretagne*, ou Avoine mondée | *Avena sativa* |
| le Millet | *Panicum miliaceum.* |
| le Panis | *Panicum italicum.* |
| l'Orge *mondé* | *Hordeum distichum.* |
| la Laitue | *Lactuca sativa.* |
| la Chicorée | *Cichorium Endivia.* |
| la Scarole | |
| le Cartame | *Carthamus tinctorius.* |
| l'Aunée | *Inula Helenium.* |
| la Santoline | *Santolina Chamæcyparissias.* |
| l'Absinte | *Artemisia Absinthium.* |
| l'Armoise | *Artemisia vulgaris.* |
| la Chardonnette, Cardière, ou Chardon à foulon | *Dipsacus fullonum campestris.* |

| | |
|---|---|
| le Sureau | *Sambucus nigra.* |
| l'Hieble, *fruit & graine mondée* | *Sambucus Ebulus.* |
| la Carotte ſauvage | *Daucus Carota.* |
| le Daucus de Crete | *Athamanta cretenſis.* |
| l'Ammi | *Ammi majus.* |
| le Perſil de Macédoine, ou le Macédoine | *Bubon macedonicum.* |
| la Ciguë | *Conium maculatum.* |
| l'Angélique | *Angelica Archangelica.* |
| le Séſeli de Marſeille | *Seſeli tortuoſum.* |
| le Cheruis | *Sium Siſarum.* |
| le Cumin | *Cuminum Cyminum.* |
| la Coriandre | *Coriandrum ſativum.* |
| le Panais ſauvage | *Paſtinaca ſilveſtris.* |
| l'Anet | *Anethum graveolens.* |
| le Fenouil doux | *Anethum Fœniculum.* |
| le Fenouil de Florence | |
| le Carvi | *Carum Carvi.* |
| l'Anis | *Pimpinella Aniſum.* |
| l'Ache | *Apium graveolens* |
| le Chilé ou Piment | *Capſicum groſſum.* |
| la Juſquiame ou Hannebanne | *Hyoſcyamus niger.* |
| le Tabac | *Nicotiana Tabacum.* |
| l'Agnus-caſtus ou le Négond | *Vitex Agnus caſtus.* |
| la Verveine | *Verbena officinalis.* |
| le Troêne | *Liguſtrum vulgare* |
| le Grémil | *Lithoſpermum officinale* |
| la Bugloſe | *Anchuſa officinalis.* |
| la Bourrache | *Borrago officinalis.* |
| le Romarin | *Roſmarinus officinalis.* |
| l'Orvale | *Salvia Sclarea.* |
| la Lavande | *Lavandula Spica.* |
| l'Ortie-blanche, ou le Lamier, | *Lamium album.* |
| la Marjolaine, | *Origanum Majorana.* |
| la Meliſſe | *Meliſſa officinalis.* |

| | |
|---|---|
| le Thim | *Thymus vulgaris.* |
| la Moldavique | *Dracocephalum Moldavica.* |
| le Baſilic | *Ocymum Baſilicum* |
| la Cameline, dite Camomile | *Myagrum ſativum* |
| le Tlaſpi | *Thlaſpi campeſtre.* |
| le Talitrõn ou Sophie | *Siſymbrium Sophia.* |
| le Chou | *Braſſica oleracea.* |
| le Navet ſauvage | *Braſſica Napus.* |
| le Senevé, ou la Moutarde | *Sinapis nigra.* |
| le Pavot blanc | *Papaver ſomniferum* album. |
| le Pavot, dit Œillette | *Papav. ſomniferum* nigrum. |
| la Violette | *Viola odorata.* |
| la Gaude | *Reſeda Luteola.* |
| la Pivoine femelle | *Pœonia officinalis* fœmina. |
| la Pivoine mâle. | *Pœonia officinalis* mascula. |
| la Staphiſaigre | *Delphinium Staphiſagria.* |
| l'Epine-vinette | *Berberis vulgaris.* |
| les *Bayes* de Laurier | *Laurus nobilis.* |
| la Rue | *Ruta graveolens.* |
| le Millepertuis | *Hypericum perforatum.* |
| l'Œillet à ratafia | *Dianthus Caryophyllus.* |
| la Nêle, ou la Nielle ſauvage | *Agroſtemma Githago.* |
| le Lin | *Linum uſitatiſſimum.* |
| le Plantain | *Plantago major.* |
| le Pſillium, ou la Pulicaire | *Plantago Pſyllium.* |
| la Millegraine du Mexique, dite Thé du Mexique | *Chenopodium ambroſioides.* |
| la Patience | *Rumex Patientia.* |
| le Pourpier vert | *Portulaca oleracea.* |
| la Cuſcute | *Cuſcuta europea.* |
| le Lierre | *Hedera Helix.* |
| les *Pepins* d'Orange | *Citrus Aurantium.* |
| les *Pepins* de Citron | *Citrus Medica.* |
| la Mauve | *Malva rotundifolia.* |
| la Mauve friſée | *Malva criſpa.* |

| | |
|---|---|
| la Guimauve | *Althæa officinalis.* |
| le Fenugrec | *Trigonella Fœnum græcum.* |
| le Lupin | *Lupinus albus.* |
| le Pois chiche rouge de Provence | *Cicer arietinum.* |
| le Pois chiche blanc | |
| le Mélilot baume, dit Baume du Pérou | *Trifolium Melilotus cærulea.* |
| le Concombre ſauvage, ou Giclet | *Momordica Elaterium.* |
| les *Semences froides mondées ; ſavoir*, | |
| de Melon | *Cucumis Melo.* |
| ou de Concombre | *Cucumis ſativus.* |
| de Courge | *Cucurbita lagenaria.* |
| de Citrouille | *Cucurbita* oblongus. |
| ou de Potiron | *Cucurbita Pepo* rotundus. |
| & de Paſteque, dite autrefois Citrouille | *Cucurbita Citrullus.* |
| les *Baies* de Mirte | *Myrthus communis.* |
| la *Graine* du petit Nerprun, dite graine d'Avignon. | *Rhamnus infectorius.* |
| l'Aigremoine | *Agrimonia Eupatorium.* |
| les *Glands* du Chêne | *Quercus Robur.* |
| le Houblon | *Humulus Lupulus.* |
| l'Ortie noire, ou grande Ortie | *Urtica dioica.* |
| l'Ortie romaine | *Urtica pilulifera.* |
| l'Epurge | *Euphorbia Lathyrus.* |
| le Ricin | *Ricinus communis.* |
| le Genièvre | *Juniperus communis.* |
| le Pin | *Pinus Pineas.* |

# ARBRES ET ARBUSTES

## PROPRES

## A L'ORNEMENT DES JARDINS,

*Dont le Sieur* ANDRIEUX *fournira des Plants de différens âges, ou des Sujets élevés en pots & en caisses, ou des Greffes & Boutures.*

---

## I. ARBRES DE BOSQUETS

*qui croissent à plus de dix pieds.*

| | |
|---|---|
| Le Cornouiller | *Cornus mascula.* |
| le Cornouiller de Virginie | *Cornus florida.* |
| le Sureau découpé | *Sambucus nigra* laciniata. |
| le Sureau panaché | *Sambucus nigra* variegata. |
| le Sureau à grapes | *Sambucus racemosa.* |
| le Lilas pourpre, bleu ou blanc. | *Syringa vulgaris.* |
| le Frêne à fleur | *Fraxinus Ornus.* |
| le Catalpa | *Bignonia Catalpa.* |
| le Tilleul de Hollande | *Tilia europea* latifolia. |
| le Tilleul de Caroline | *Tilia americana.* |
| le Gaînier ou Arbre de Judée | *Cercis siliquastrum.* |

| | |
|---|---|
| le Citiſe des Alpes | *Cytiſus Laburnum.* |
| l'Acacia | *Robinia Pſeudo-acacia.* |
| le Baguenaudier | *Colutea arboreſcens.* |
| le Paliure, ou Argalou | *Rhamnus Paliurus.* |
| le grand Fuſain, | *Evonymus europeus* latifolius. |
| le Patenôtier ou faux Piſtachier | *Staphylæa pinnata.* |
| le Pûtier ou Cerifier à grapes | *Prunus Padus.* |
| le Mahaleb ou Bois de Sainte Lucie. | *Prunus Mahaleb.* |
| l'Alizier | *Cratægus torminalis.* |
| l'Alizier-cirier | *Cratægus Aria.* |
| l'Azerolier | *Cratægus Azarolus.* |
| l'Azerolier de Canada | *Cratægus coccinea.* |
| l'Azerolier-luiſant | *Cratægus Crus-galli.* |
| le Pinchot | *Cratægus tomentoſa.* |
| le Cochêne ou Sorbier des oiſeaux. | *Sorbus aucuparia.* |
| le Cormier ou Sorbier cultivé | *Sorbus domeſtica.* |
| le Piracante, ou Buiſſon ardent | *Meſpilus Pyracantha.* |
| le Maronier rouge, dit Pavia | *Æſculus Pavia.* |
| l'Erable | *Acer campeſtre.* |
| l'Erable de Montpellier. | *Acer monſpeſſulanum.* |
| l'Erable de Candie | *Acer creticum.* |
| l'Erable-ſicomore | *Acer Pſeudo-platanus.* |
| l'Erable-plâne | *Acer Platanoides.* |
| le Saule du Levant, dit Saule paraſol | *Salix babilonica.* |
| le Peuplier de Lombardie | *Populus nigra* lombarica. |
| le Peuplier blanc ipréau | *Populus alba* excelsior. |
| le Peuplier-baumier | *Populus balſamifera.* |
| le Peuplier de Canada | *Populus heterophylla.* |
| le Peuplier de Caroline | *Populus latifolia.* |
| le Platane | *Platanus orientalis.* |

| | |
|---|---|
| le Platane de Virginie | *Platanus occidentalis.* |
| le Charme d'Italie | *Carpinus Oſtrya.* |
| l'Orme ipréau | *Ulmus campeſtris* latifoliæ |
| l'Orme panaché | |
| le Micocoulier | *Celtis auſtralis.* |
| le Noiſetier | *Corylus Avellana.* |
| l'Avelinier. | |
| le Mûrier blanc | *Morus alba.* |
| le Mûrier roſe | |

## II. ARBUSTES

*Propres à mettre en pallissades ou en massifs de bosquets bas.*

| | |
|---|---|
| LA Bacante | *Baccharis halimifolia.* |
| la Viorne | *Viburnum Lantana.* |
| la Viorne de Canada | *Viburnum prunifolium.* |
| la Viorne-lentaigne | *Viburnum Lentago.* |
| l'Obier-boule-de-neige | *Viburnum Opulus.* |
| le Chèvre-feuille | *Lonicera Periclymenum.* |
| le Chèvre-feuille d'Italie | *Lonicera Caprifolium.* |
| le Chèvre-feuille vert, dit semper, entr'autres le Corail. | *Lonicera ſempervirens.* |
| le Camérifier ou Chamæcerasus. | *Lonicera Xyloſteum.* |
| le Camérifier noir | *Lonicera nigra.* |
| le Camérifier de Sibérie | *Lonicera tatarica.* |
| le Camérifier des Pirenées | *Lonicera pyrenaica.* |
| le Camérifier des Alpes | *Lonicera alpigena.* |
| le Camérifier bleuet | *Lonicera cœrulea.* |
| le Jaſminode | *Lycium europeum.* |
| le Lilas de Perſe | *Syringa perſica.* |
| — à feuilles découpées | |
| le Troêne | *Liguſtrum vulgare.* |
| le Jaſmin | *Jaſminum officinale.* |
| le Jaſmin-trèfle | *Jaſminum fruticans.* |

| | |
|---|---|
| le Jaſmin jaune | *Jaſminum humile.* |
| la Bignone de Virginie, dite grand Jaſmin de Virginie. | *Bignonia radicans.* |
| le Négond, ou Agnus-caſtus | *Vitex Agnus-caſtus.* |
| la Clématite violette | *Clematis Viticella.* |
| — à fleurs doubles | |
| l'Epinevinier | *Berberis vulgaris.* |
| la Grenadille | *Paſſiflora incarnata.* |
| la Grenadille jaune | *Paſſiflora lutea.* |
| la Grenadille bleue, dite Fleur de la passion. | *Paſſiflora cœrulea* |
| la Vigne-vierge | *Hedera* (seu vitis) *quinquefolia.* |
| la Soutenelle | *Atriplex Halimus.* |
| le Rédoul | *Coriaria myrtifolia.* |
| le Mézéréon ou Bois-gentil | *Daphne Mezereum.* |
| la Timélée des Alpes odorante | *Daphne Cneorum.* |
| la Lauréole. | *Daphne Laureola.* |
| l'Arcouſſe | *Hippophae Rhamnoides.* |
| la Quetmie, dite Althæa frutex : plusieurs variétés à fleur blanche, ou pourpre & à feuilles panachées. | *Hibiſcus ſyriacus.* |
| le Citiſe, Trifolium des jardiniers | *Cytiſus ſeſſiliſolius.* |
| le Citiſe velu | *Cytiſus hirſutus.* |
| l'Emere, Securidaca des jardiniers | *Coronilla Emerus.* |
| l'Amorfiſe ou faux Indigo | *Amorpha fruticoſa* |
| l'Acacia rouge | *Robinia villoſa.* |
| l'Apiot, dit Phaseoloïdes. | *Glycine Apios.* |
| le Seringat | *Philadelphus coronarius.* |
| le Roſier-canelle | *Roſa cinnamomea.* |
| l'Eglantier odorant | *Roſa Eglanteria* |
| le Roſier de Bourgogne | |
| le Roſier de Meaux ou à pompons | |
| l'Eglantier blanc | *Roſa* alba. |

| | |
|---|---|
| le Roſier jaune | *Roſa* lutea. |
| le Roſier cent-feuilles | *Roſa centifolia.* |
| le Roſier mille-feuilles | |
| le Roſier de provins | *Roſa* provincialis. |
| le Roſier ſans épine | *Roſa* alpina. |
| le Roſier des mois : & des varietés les plus belles de toutes ces diverses Roses. | *Roſa* bifera. |
| la Ronce à fleur double | *Rubus fruticoſus* multiplex. |
| la Ronce ſans épines | *Rubus fruticoſus* alpinus. |
| le Framboiſier de Virginie odorant | *Rubus occidentalis.* |
| l'Amandier nain | *Amygdalus nana.* |
| l'Aubépin double | *Cratægus Oxyacantha.* |
| la Spairelle ; Cytise des jardiniers | *Spiræa hypericifolia.* |
| la Spairelle à grappes | *Spiræa ſalicifolia.* |
| la Spairelle crenelée | *Spiræa crenata.* |
| le Sumac | *Rhus Coriaria.* |
| le Sumac-vinaigrier. | *Rhus glabrum.* |
| le Sumac velu | *Rhus typhinum.* |
| le Sumac-vernis | *Rhus Vernix.* |
| le Sumac-poiſon | *Rhus Toxicodendron.* |
| le Fuſtet | *Rhus Cotinus.* |

## III. ARBRES TOUJOURS VERTS.

| | |
|---|---|
| Le Lauritin, dit Laurier-tin | *Viburnum Tinus.* |
| la Buplèvre | *Buplevrum fruticoſum.* |
| le Filaria | *Phillyrea media.* |
| le Filaria dentelé | *Phillyrea latifolia.* |
| le petit Filaria | *Phillyrea anguſtifolia.* |
| la Pervenche, blanche, violette, double, panachée en blanc & en jaune. | *Vinca minor.* |
| le Laurier | *Laurus nobilis.* |
| le Tamariſc | *Tamarix gallica.* |

| | |
|---|---|
| le Lierre, tant le commun que les pannachés & ceux en arbre. | *Hedera Helix.* |
| le Genêt d'Eſpagne | *Spartium junceum.* |
| l'Alaterne commun & les panachés en or & en argent des plus beaux. | *Rhamnus Alaternus.* |
| le Houx ordinaire & les plus curieuses variétés panachées & bordées de blanc ou de jaune & les Houx-hérissons. | *Ilex Aquifolium.* |
| le Buis de bois ou grand Buis | *Buxus ſemper virens arboreſcens.* |
| le Buis nain | |
| — panaché de blanc ou de jaune | |
| le Buis d'Artois pour les bordures | *Buxus ſempervirens ſuffruticoſa.* |
| le Genêvrier de Virginie | *Juniperus virginiana.* |
| le Genêvrier de Bermude | *Juniperus bermudiana.* |
| le Genêvrier-cèdre | *Juniperus Lycia.* |
| le grand Genêvrier | *Juniperus phœnicea.* |
| la Sabine de diverſes varietés. | *Juniperus Sabina.* |
| le Ciprès | *Cupreſſus ſempervirens.* |
| le Ciprès-faiſceau, dit femelle | |
| le Tuyer, ou arbre de vie de Théophraſte | *Thuya occidentalis.* |
| le Tuyer de la Chine | *Thuya orientalis.* |
| le Pin | *Pinus ſilveſtris.* |
| le Pin-pignon | *Pinus Pinæas.* |
| le Pin à trochet | *Pinus Tæda.* |
| l'Alviez | *Pinus Cembra.* |
| le Mélèze | *Pinus Larix.* |
| le Sapin | *Pinus Picea.* |
| le Sapin-baumier | *Pinus balſamea.* |
| la Peſſe, dite Epicia | *Pinus Abies.* |

## IV. ARBRES ET ARBUSTES D'ORANGERIE.

| | |
|---|---|
| La Morelle-cerisette, ou l'Amomum | *Solanum Pseudoapsicum.* |
| le Jasmin d'Espagne | *Jasminum grandiflorum.* |
| le Rosage, ou Laurier-rose | *Nerium Oleander.* |
| — blanc | |
| l'Héliotrope du Pérou | *Heliotropium peruvianum.* |
| le Tarafpi d'hiver | *Iberis semperflorens.* |
| le Citronier | *Citrus Medica.* |
| le Limonier, | *Citrus Medica Limon.* |
| l'Oranger-pampel, dit Pompoleum, Pampelmous | *Citrus decumana.* des Indes. |
| le Bigaradier | *Citrus Aurantium.* |

l'Oranger de la Chine

l'Oranger de Malthe, & plusieurs belles variétés de ces diverses races.

| | |
|---|---|
| le Margousier ou Azédarac, Lilas des Indes & faux Sicomore. | *Melia Azedarach.* |
| le Mirte | *Myrtus communis.* |

le petit Mirte ou Romain, & tous les deux à fleurs doubles.

| | |
|---|---|
| le Grenadier à fleur double | *Punica Granatum.* |

Et en général tous les Arbrisseaux & même des diverses Plantes de pleine terre, d'Orangerie ou des Serres chaudes les plus rares que le *Sieur Andrieux* fournira toujours fidèlement lorsqu'ils seront connus en France, suivant les demandes qui lui en seront faites, soit par les noms latins de M. von Linné ou d'autres auteurs, soit par les noms françois d'usage, ou par des descriptions exactes.

OBSERVATIONS

# OBSERVATIONS

## *Sur le tems propre à ſemer la plupart des Graines mentionnées ci-deſſus.*

Semences de la S. Jean.

Dès que le ſolſtice d'été eſt paſſé, on commence à ſonger à la récolte de l'année ſuivante. On ſème à la fin de Juin les Choux friſés-pointus, pour les avoir de primeur au Printems.

Juillet.

On ſème en Juillet des Carottes & Panais pour paſſer l'hiver; dans les terres fortes, de l'Oignon blanc pour replanter en Octobre; dans les terres légères, on ne le ſémera qu'en Août.

Au vingt de ce mois ſemer un peu de Choux-fleurs pour paſſer l'hiver. On peut ſemer auſſi du Cheruis, de la Scorſonnaire, &c.

Semer à l'abri diverſes fleurs pour les repiquer au printems & fleurir au commencement de l'Eté ſuivant; ſavoir:

La Nigelle, le Taraſpi d'été, l'Adonis ou Adonide, le Sain-foin d'Eſpagne, la Delphinette ou Pied-d'allouette vivace, la Pyramidale, l'Oeillet de poëte, la Digitale dès qu'elle eſt recueillie, les Paſſes-roſes, &c.

Semer dans des caiſſes de terre légère, les graines de Tulipe pour les mettre à l'abri l'hiver; de la graine d'Anémone qu'on mêle avec du ſable ſec; lui donner une terre bien préparée, & la couvrir de l'épaiſſeur d'un demi-pouce au plus de terreau bien paſſé, l'arroſer peu & ſouvent. Semer, auſſi-tôt récoltée, la graine de Ciclame dans des pots ou caiſſes.

Planter les oignons de Lis, de Martagons, de Couronnes impériales, de Narciſſes, de Belladone & autres plantes bulbeuſes, qu'on ne doit pas garder hors de terre.

Aoust. On ſême au mois d'Août de la Poirée qui ſe trouve très-hâtive au Printems, mais elle eſt délicate à la gelée ; de l'Oſeille, du Perſil, du Cerfeuil.

On élève du plant de diverſes Laitues à planter ſur couche en hiver, & en terre à bonne expoſition ; ſavoir, Laitues Cocaſſe, d'Italie, Coquille, Crêpe & Romaine d'hiver.

On ſême la graine de Raiponce mêlée avec de la terre ou du ſable bien fin, dans une terre bien préparée, où l'on ſêmera en même tems des Radis, pour que l'ombre que leurs feuilles donneront à la Raiponce l'empêche de brûler, ſi le ſoleil étoit ardent.

Semer des Choux, pommé-hâtif, friſé-hâtif, de Bonneuil, d'Alſace & de Milan, pour planter après l'hiver & cueillir en Mai & Juin ; du Chou-fleur dur pour deuxieme fois que l'on conſerve dans la ſerre en baquet ou en pepinière en bon abri, & des Brocolis, à replanter en place au Printems.

On ſême encore des Navets pour enſabler en novembre dans la Serre, ou les couvrir dehors.

Dans les terres légères ſemer l'Oignon blanc hâtif & de la Ciboule.

Semer de la graine des diverſes Fraiſes, à cinq à ſix pieds d'un mur du nord ou du couchant ſur un bon labour, terre fraîche bien dreſſée, couverte de deux lignes de ſable & terreau tamiſés ; ne couvrir la graine que très-peu de ce même mêlange, la ſarcler ſoigneuſement, & l'attendre un mois, quelquefois plus.

Semer les graines d'Anémones, comme on le voit indiqué dans le mois précédent, de la graine de Renoncule qu'il faut couvrir très-légérement de terre ou terreau bien paſſé.

Planter les Anémones & les Jonquilles ſimples, la Renoncule-pivoine pour fleurir l'hiver.

Planter auſſi les Jacintes communes, blanc de montagne, de Vitry, Paſſe-tout, &c.

Semer la graine de Jacinte.

SEPTEMBRE.

ON peut encore ſemer en Septembre preſque tout ce qui a été indiqué pour les deux mois précédens, & en outre des Radis noirs pour tout l'hiver, des Panais & Carottes pour avril, mai & juin.

Planter les Fraiſiers, ſi on veut en jouir l'année ſuivante; voyez plus bas en novembre.

Semer les petits Pois & Haricots de Hollande à bouquets, pour les mettre ſur les couches chaudes ſous chaſſis quand le tems devient rude.

Semer diverſes fleurs pour fleurir en place dans l'Eté ſuivant, comme les Pavots, les Coquelicots, les Pieds-d'allouette ou Delphinettes, les Taraſpis de diverſes couleurs, &c.

Semer de la Quarantaine pour repiquer de bonne heure, même de la grande Giroflée, en terre ſèche, mêlée de décombres de chaux, ſuivant Bradley.

On peut ſemer encore des Anémones, Renoncules, & autres graines de plantes bulbeuſes ou à tubercules; on ſait qu'elles demandent de grands ſoins en hiver contre les pluies, la neige & le givre.

Planter des Renoncules, des Anémones, des Narciſſes de Conſtantinople & autres de toutes eſpèces, même des Jacintes, des Jonquilles & des Tulipes à la fin du mois.

Dans certaines terres tardives, ces premières plantations plus hâtives ont en hiver plus de beſoin d'être garanties des intempéries.

Mettre les Oignons en caraffes pour fleurir l'hiver, comme Narciſſes doubles de Conſtantinople, Narciſſe blanc, Soleil d'or de Hollande & les Jacintes de toutes eſpèces, même des Jonquilles.

OCTOBRE.

DANS le mois d'Octobre on ſème encore en diverſes fois la Mâche & l'Epinar pour le Carême; le Cerfeuil pour le Printems.

On fait la ſeconde ſemence de divers plants qui portent le nom de la Saint-Remi, comme Laitue-Crêpe, de la Paſſion, Coquille, Gotte & Romaine hâtive pour replanter; Choux pommés, friſés-hâtifs,

OCTOBRE. & Choux-fleurs durs à repiquer à l'abri ſous cloche & couverts de litière. Commencer à ſemer des Pois-michauds au pied des murs à bonne expoſition.

Les curieux de nouveautés qui veulent, à force de dépenſe, manger des Concombres en Avril, commencent à les ſemer en pleine terre pour les tranſplanter en pots, afin de les mettre d'abord à couvert des nuits fraîches, puis ſur les couches chaudes ſous chaſſis, quand il ſera beſoin.

Ils ſèment auſſi des Pois nains & des Haricots dans des paniers que l'on expoſe au midi, que l'on deſtine à être mis en ſerre les nuits, puis ſur les couches chaudes à l'arrivée des tems rudes.

Planter des œilletons d'Artichauds pour le Printems, les arroſer peu.

Dans ce mois on commence à planter toutes les eſpèces d'arbres fruitiers & autres, & on continue au Printems dans les tems favorables.

Il faut auſſi ſemer la Sérante ou Immortelle & autres fleurs annuelles qui réſiſtent au froid.

Planter les Jacintes de toutes eſpèces, Narciſſes, Jonquilles, Tulipes, Anémones, Renoncules, &c.

NOVEMBRE. ON fait à la Touſſaint, ſur les nouvelles couches, les premières ſemences de Laitue & de Radis, de Creſſon, &c.

On ſème dans les terres fortes des Pois-michauds aux coſtieres bien terreautés de gadoue & de fiente de Pigeons.

On ſème le fruit de l'Amandier, les noyaux de Prunes, de Pêches au pied des Eſpaliers pour greffer en place; on enſable les Noyaux qu'on veut planter au Printems dans les pépinières, & l'on enterre diverſes graines d'arbres à trois pieds en terre, où, à l'abri de la gelée, elles ſe façonnent & ſe diſpoſent à mieux germer, comme celles d'Aubépin, de Sicomore, de Frêne, &c. &c.

On plante la plupart des arbres fruitiers. ſur-tout ceux de nature hâtive, & néceſſairement dans les terres légères & chaudes.

On plante les Oignons de Tulipes, d'Ornitogales, de Narciſſes de Conſtantinople, les Semi-doubles, Anémones, Jacintes & autres, s'il en reſte; & ces oignons plus tardifs réſiſtent mieux aux froids. NOVEMBRE.

On peut planter tous les arbriſſeaux qui perdent leur verdure, & qui ne ſont point ſujets à la gelée.

On peut au commencement de ce mois planter dans des pots des Jacintes, des Narciſſes, des Jonquilles, des Tulipes, des Prime-veres, &c., & les mettre ſur des couches chaudes pour fleurir dans l'hiver.

ON ſème ſur les couches de Décembre des Radis & Raves, des Salades, du Creſſon & Moutarde pour fourniture; des Concombres; mais il faut bien de la ſurveillance pour faire réuſſir cette culture dans un tems où l'on ne peut donner aux plantes l'air ſi néceſſaire à leur végétation, ſans introduire un froid humide, qui contrarie beaucoup la température artificielle des fumiers chauds. DÉCEMBRE.

On ſait qu'alors les couches doivent être fort étroites, afin que la chaleur des réchauds dont on les entoure, puiſſe pénétrer juſqu'à leur centre.

On peut planter des Renoncules, Anémones, Tulipes & tous les autres oignons qu'on n'a pas été à portée de planter auparavant.

LE Soleil monte au mois de Janvier, & commence en quelque ſorte, avec la nouvelle année, un nouvel ordre de végétation; les boutons des arbres ſe gonflent, quelques-uns s'entr'ouvrent; tels ſont ceux des chatons du Peuplier-tremble, du Noiſetier & autres. JANVIER.

Toutes les ſemailles des mois précédens, dont l'approche de l'hiver ralentiſſoit la venue, annoncent, dès qu'il eſt arrivé, le prochain renouvellement de la Nature. Auſſi devient-il plus aiſé de faire de nouvelles ſemailles de primeur en uſant des mêmes ſecours qu'en Décembre, c'eſt-à-dire, des couches

JANVIER. chaudes, des chaſſis vîtrés & des couvertures de litière.

On ſème donc la Laitue à couper, dite petite Laitue, la Chicorée ſauvage & les Fournitures, le Naſitor, le Pourpier vert, la Pimprenelle, la Corne de cerf, le petit Céleri, les Radis & petites Raves de primeur, de la Carotte jaune-courte, ſi l'on veut : on élève du plant des Laitues, Crêpe, Gotte, de Verſailles; des Romaines; de Chicorée, de Céleri, de Cardons pour repiquer ſur couche; des Choux Pommé-hâtif, Friſé-hâtif, de Bonneuil, d'Alſace, de Chou-fleur d'angleterre, de Chou-fleur tendre, de Brocolis blanc & violet. Enfin les Melons & Concombres de primeur qu'il faut replanter tous les quinze jours, pendant deux mois, ſur de nouvelles couches.

Semer, avec les ſoins recommandés, des Pois hâtifs & Haricots en bonne expoſition. Si le tems eſt favorable, on plante des pattes d'Anémones & des griffes de Renoncules, même divers Oignons, s'il en reſte.

FÉVRIER. Si la terre n'eſt ni gelée, ni couverte de neige, on continue à ſemer ſur couche les petites Salades & leurs fournitures, les Radis, mêlés, ſi l'on veut, de Carottes, de Navets & de Panais. Dans les terreins chauds, on ſème les Oignons de primeur, le Poireau, la Ciboule, des Pois, des Fèves de marais; ſemer du Perſil; riſquer la Scorſonnaire, les Cheruis, pour les replanter lorſqu'ils ont deux pouces de longueur; ils en viendront beaucoup plus beaux.

Semer ſur couche fort drus des Pois-michauds, pour replanter ſur une autre couche, en Mars; des Haricots & Pois ſur couche en mannequin, pour les remettre en terre & ſuccéder aux autres. Semer ſur les couches, dont la chaleur ſe paſſe, du Chou-fleur, Brocolis, Chou pommé, Chou de milan, Chou d'angleterre à pain de ſucre, pour les avancer & replanter au mois de Mars en place.

On élève auſſi ſur couche du plant de Chicorée & de Scarole pour l'Eté, des Laitues Gotte, Brune, Mouſſerone, Crêpe, ſur-tout des Laitues Hollandoiſe & de Verſailles, qu'on repique en place en pleine terre ; élever auſſi du plant de Romaine. FÉVRIER.

Planter en terrein leger de l'Echalotte, de l'Ail & de la Rocambole.

Commencer à planter des Morelles-truffes, dites auſſi Pommes de terre & Patates, & des Topinambours.

Semer ſur couche ſous chaſſis des Melons & Cantaloux qu'il faudra replanter deux fois ſous clocheou chaſſis.

Sur la fin du mois ſemer des Melons maraîchés & autres tardifs que l'on ne replantera qu'une ſeule fois, & des Concombres.

Semer de la graine d'Aſperges en pleine terre.

Semer toutes ſortes de graines d'Arbres, comme les Glands, les Châtaignes, les graines d'Orme, de Troêne, de Sicomore, de Tilleul de Hollande, de Pin, de Pin de Hollande, de Sapin, de Sapin de Piémont, d'Aubépine, &c. Les baies de Laurier, de Houx, d'If, & diverſes graines d'Arbuſtes à fleurs ; les faire germer dans le ſable pour la plûpart, ſi on ne les a pas miſes en terre pendant l'hiver.

Planter toutes les eſpèces d'Arbres à fruits, d'Arbres de forêt, & toutes les eſpèces d'Arbuſtes qui s'accommodent de notre climat.

Continuer de planter des Anémones & Renoncules.

Semer des graines d'Auricules, dans des caiſſes de terre légère, mêlée de bois ou de feuilles pourries ; les mettre à l'ombre, & arroſer peu & ſouvent; des graines de Prime-vères, fort épais, dans une coſtière au Nord.

Semer les Fraiſes, ſi on ne l'a pas fait en Août.

Semer ſur couche des Baſilics & pluſieurs fleurs d'Eté, Tricolor, Ambrette, Amarante, Roſes-trémieres, Delphinette ou Pied-d'allouette, Campanule, Œillet de poëte, Giroflée, Quarantaine, Taraſpi, &c.

FÉVRIER. Semer les Pepins d'Orange & de Citron. Faire des boutures de toutes nos eſpèces d'arbuſtes.

MARS. LES Semences de Février ſe répétent en Mars ſur de nouvelles couches, ſoit pour l'uſage, ſoit pour remplacer le plant qui auroit manqué, ou pour y ſuccéder.

Ce mois eſt celui où l'on ſème le plus de Verdures, de Racines & autres Légumes en pleine terre : L'Arroche, la Poirée, l'Oſeille, la Carotte, le Panais, le Navet printannier, les différens Oignons, les Raves & Radis, quelques Scorſonnaires & Salſifis ; enfin Epinar, Cerfeuil, Creſſon, Coronope ou Corne-de-cerf, Capucines, Pourpier, &c.

Elever différentes Laitues & Romaines, du Chouſleur tendre, du Cardon.

Planter des Pois, des Fêves de marais groſſes & petites, & riſquer quelques Haricots.

Semer des Aſperges en pleine terre, & planter les racines qui ſe vendent au cent.

On élève ſur couche le Chilé ou Poivre long, la Nigelle épicée, la Mélongene, la Moldavique qu'on deſtine à être placées ſur couches ou ſur des ados de terreau ; on y ſème auſſi les Pervenches-roſes, la Senſitive, la Glaciale, le Camara, pour les élever en pots, de même que les Tubereuſes doubles & ſimples qu'on y plante en pots.

Les fleurs d'Automne ſe ſèment au pied d'un mur au midi dans du terreau, la Balſamine, les Reines-marguerites, le Soucis, les Amarantoïdes, les Paſſe-velours, les Tagettes dites Roſes & Œillets d'Inde, les Merveilles ou Belles de nuit, l'Œillet de la Chine, le Liſeron des Indes & la Belle de jour.

Séparer & replanter les Pâquerettes, les Hépatiques, les Juliennes doubles, Œillets d'Eſpagne, Licnide ou Croix de jéruſalem, Boutons-d'or, Campanules doubles, &c.

Replanter le Baume, le Thim, la Lavande, le Romarin, l'Hiſope, &c.

On fait en ce mois les ſemailles de Soucrion, du Froment de Smirne & des Prairies artificielles, ainſi que de tout ce qu'on nomme les Mars. MARS.

Achever les plantations d'Arbres & d'Arbuſtes, ſi elles ne le ſont pas.

On fait les plantations de la plupart des Fraiſiers pour produire dans les deux années ſuivantes ſeulement, & non dans la même année.

ON ſème la Scorſonnaire, le Salſifi & les Bette-raves ; ces racines tendres à la gelée, ſemées précédemment, pourroient être péries. EN AVRIL.

On ſème de la Poirée blonde à replanter pour manger en cardes ; on ſème les Cardons d'Eſpagne & de Tours, la Chicorée ſauvage pour blanchir l'hiver.

On ſème les Pois goulus, nains & à rame, le Pois quarré-vert pour faire ſécher & d'autres eſpèces ; des Fèves de marais. On commence les ſemailles de Haricots. Il eſt bon de ſemer une partie de ſes Giraumons, Potirons, Pépons, Paſtiſſons, Cougourdettes, &c.

On ſème des Epinars à l'ombre, des Laitues pour pommer, comme Verſailles, Mouſſeronne, Italie, Royale, Batavia, &c. des Romaines. Semer ſur terre en bonne expoſition du Pourpier doré, du Céleri, de l'Oſeille, ſoit en planche, ſoit par rayons, des Raves, des Radis, blancs, rouges & des petits Radis gris ; du Creſſon, de la Chicorée ſauvage, du Perſil, &c. On continue de ſemer les Choux-fleurs & ſur-tout le dur.

On peut ſemer encore de l'Oignon, de la Ciboule, du Poireau ; enfin tous les légumes qui auroient manqué, ou qu'on n'auroit point ſemés dans le mois précédent.

Planter des Aſperges & regarnir celles qui paroiſſent avoir manqué ; planter les Artichauts.

On continue de ſèmer encore toutes les eſpèces de graines de Fleurs annuelles ; mais on élève ſur-tout diverſes eſpèces qu'on ne pouvoit encore ſemer en

Avril. Mars, au moins ſans chaſſis, le Réſéda, les deux Tagettes de différentes nuances, les Merveilles, le Sénecon d'Afrique, les Scabieuſes, les Ancolies, &c. On ſème auſſi des Paſſes-roſes.

On plante encore des Tubéreuſes doubles & ſimples, l'Œillet d'eſpagne, l'Œillet de poëte, la Julienne double, la Croix de jéruſalem, les Renoncules-baſſin ou Boutons d'or, la Barbarée, &c.

On ſème le Maïs, le Panis, & l'on continue à ſemer des Mars, ſi on ſe trouve retardé.

Mai. On peut encore ſemer au mois de Mai des Betteraves, de la Scorſonnaire, des Concombres en pleine terre, ſur-tout le Cornichon; du Chou-fleur dur & de celui d'Angleterre, des Cardons de Tours & d'Eſpagne; des Laitues pour pommer & des Romaines; quelques Raves & Radis, de la Chicorée & Scarole, du Pourpier en pleine-terre, des Haricots de toutes eſpèces & des Pois ſans pareils, Anglois, de Marli, de Clamart, quarrés blancs & au cul noir, &c.

On ſème le Chanvre de Piémont, ainſi que le Commun, & le Sorgo.

On finit d'œilletonner & planter les Artichauts.

On peut ſemer encore quelques graines de Fleurs d'Automne, Quarantaine, Nigelle, Taraſpi, Doucette ou Miroir de Vénus, Delphinette, &c. C'eſt le meilleur tems pour ſemer celle d'Œillet. On ſème des Giroflées pour le Printems ſuivant.

Juin. L'Eté eſt le tems de la récolte; il n'eſt plus guère queſtion de ſemer ni de planter; on ſème cependant encore en Juin, dans les parties à mi-ombre, des Epinars & des Fournitures; mais ces ſemences hebdomadaires n'ont qu'une coupe.

On ſème la groſſe Rave, le Radis long, le petit Radis noir & le gros, de la graine de Raiponce, comme en Août, en l'arroſant ſouvent; on ſème des Laitues pour pommer & des Chicorées, des Haricots-ſuiſſes & des Pois-michauds & au Cul-noir pour les derniers.

Semences automnales.

Après Juin juſqu'à l'hiver, outre les ſemences qu'on a vu plus haut qu'il falloit faire en avances pour l'année ſuivante, on en fait encore d'autres, dont on eſt payé ſur le champ ; telles ſont les ſemences hebdomadaires, c'eſt-à-dire, les Fournitures de Salade & l'Epinar, les Radis, les Raves, les Navets & Radis gris ; on élève encore du plant de Laitues & de Chicorée, & même diverſes graines légumineuſes, comme Haricots, ſur-tout les Suiſſes, Pois-michauds, Marli, Quarré blanc, Cul noir, &c. Car, quoiqu'on ait obſervé que rien de ce qu'on ſème après le Solſtice d'Eté n'amène les graines à maturité, comme on ſe contente ici de ces graines vertes, on peut en faire la récolte.

Enfin ceux qui ne craignent aucunes dépenſes pour ſe procurer des raretés, ſèment au commencement de Juillet des Concombres, dont ils recueillent les fruits, à force de fumier, en Décembre & Janvier.

On obſervera que pour la dernière ſemence de Pois à faire en Août, on choiſit le plus hâtif qui eſt le Michaud ; en effet, il n'y a pas de tems à perdre, & les graines les plus hâtives réuſſiſſent toujours plus difficilement ſur le déclin de la campagne, qu'elles n'auroient fait au commencement, lorſque chaque jour amène du changement en mieux ; au lieu que dans l'Automne on ne peut s'attendre que d'aller de pis en pis.

# INSTRUCTION

## *Sur la manière de ſemer la plupart des Fourages & quelques Plantes de grande culture.*

### Le Thimoty.

Le Thimoty des Anglois qui eſt notre grande Maſſette, aime les terreins humides, & réuſſit fort bien dans un ſol marécageux; s'il étoit au point de ne pouvoir le labourer avec la charrue, on choiſira le tems le plus ſec pour préparer la terre avec la bêche, & on en profitera pour enſemencer, ſans avoir égard à la ſaiſon.

Si l'on ſême dans une terre moins humide, on la prépare comme pour y mettre de l'avoine. Cette graine eſt extrêmement menue; il faut avoir l'attention de la mêler avec de la terre préparée ou du ſable, afin de la répandre également, ce que l'on ne ſeroit point ſûr de faire ſans cette précaution. Il faut faire herſer le champ, afin de le rendre uni, & de couvrir la ſemence.

On coupe le Thimoty auſſi-tôt qu'il commence à former ſon épi, afin que le fourage ne ſoit point trop dur; on fait deux récoltes par an, dont on tire tant de foin qu'on en eſt ſurpris. Ce fourage convient à tous les beſtiaux, les chevaux le mangent avec grand appétit; on peut les faire pâturer dans le pré, après la ſeconde récolte, car alors les fortes racines de cette plante ſeront ſi bien liées, que l'on ne craindra pas qu'ils y enfoncent quand même le terrein n'auroit pû les porter auparavant. Il faut quatre livres de cette graine à l'arpent; on la ſême depuis Mars juſqu'à la fin de Septembre, & la prairie dure au moins douze ans.

## Le Fromental.

La culture du Fromental, ou Ray-grass de Dom Miroudot, eſt la même que celle du Ray-grass d'Angleterre dont il eſt parlé ci-après ; il ſe ſème dans le même tems, mais n'a pas le même uſage ; cette prairie artificielle fournit un foin très-abondant & très-nourriſſant. D'ailleurs elle réuſſit où le Sain-foin même ne ſubſiſteroit pas. On ſème ordinairement le Fromental mêlé avec de l'Avoine ou du Trèfle noir, parce que ſemé ſeul, il eſt trop foible & peu garni dans la première année. Il faut environ quatre-vingts livres de cette graine pour un arpent.

## Le vrai Ray-grass.

Le Ray-grass a toutes ſortes d'avantages qui doivent nous engager à le cultiver ; tout ſol lui convient ; il réuſſit dans un terrein froid, humide, argilleux, ou dans un ſol ſec, aride, pierreux ou ſablonneux ; de toutes les plantes, c'eſt celle qui réſiſte le mieux aux gelées : il paroît être de ſon eſſence de braver la nature des climats & des ſols, & de produire toujours d'abondantes récoltes. C'eſt en outre une des meilleures nourritures que l'on puiſſe donner aux beſtiaux & ſur-tout aux moutons, ſoit qu'on leur donne en vert ou en ſec à l'étable, ſoit qu'on les faſſe pâturer ſur le pré ; ce qui ne peut être qu'avantageux à cette plante, qui talle conſidérablement lorſqu'elle eſt tenue baſſe par le bétail qui la broute, & repouſſe, auſſi-tôt qu'elle eſt coupée, des chalumeaux tendres & de jeunes feuilles très-délicates. Son foin eſt non-ſeulement très-ſain, mais encore délicieux pour les chevaux, qui le mangent avec un appétit ſingulier, lorſqu'on a eu ſoin de le faucher auſſi-tôt que ſon épi eſt formé, parce qu'alors il eſt très-tendre & plein de ſuc. Il donne du feu au cheval, & corrige par ſa ſéchereſſe naturelle d'autres

fourages dont l'excès peut occaſionner des maladies putrides dans le gros & le menu bètail.

On ſème le Rai-grass de Printems & d'Automne, ſeul ou avec d'autres herbes ; mêlé avec le Trèfle, il le fait ſubſiſter plus long-tems, & forme un excellent fourage. On choiſit pour cette opération un tems calme, la graine étant légère : il faut unir le terrein, autant qu'il eſt poſſible, par la herſe & le rouleau, ce qui doit ſe pratiquer pour toutes les prairies, non-ſeulement dans la vue de les rendre plus faciles à faucher, mais parce que la terre ſe trouvant reſſerrée & affermie, elle ſe deſſèche moins promptement.

Un grand avantage que l'on trouve encore dans le Ray-grass, c'eſt qu'il étouffe les mauvaiſes herbes, & reſte ſeul où on l'a ſemé. Cette Graminée, connue de nos Fermiers ſous le nom de Pain-vin, eſt d'une reſſource infinie, & il eſt d'une grande économie d'en avoir toujours un pré, puiſqu'on peut le faucher dès le mois d'Avril pour donner en vert aux beſtiaux, même dès la première année, & ſemée en Septembre précédent ; elle devient par là d'une grande reſſource dans les années où les autres fouiages manquent. Il faut environ quarante-cinq livres de graine pour enſemencer un arpent.

## Le Birds-grass.

La Poherbe d'Amérique, nommée Birds-grass, ou Graine d'oiſeaux d'Angleterre, exige une bonne terre bien préparée ; quoiqu'elle paroiſſe moins bien réuſſir d'abord dans les terreins humides, elle y fait des progrès étonnans quand elle a acquis aſſez de force pour ſupporter cette humidité. Il faut la ſemer ſeule à cauſe de ſa délicateſſe à la ſortie de la terre ; il ſe trouve toujours trop d'autres plantes qu'on doit avoir ſoin d'ôter : il y a de l'avantage à labourer la terre, à la herſer, & à y faire paſſer le rouleau quelque tems avant que de l'enſemencer, pour faciliter la ſortie des mauvaiſes herbes, que l'on détruira, ſoit avec la herſe, ſoit en

ſarclant lorſqu'elles ſeront levées; & alors, ſans autre labour, on pourra ſemer; obſervant de n'enterrer que très-peu la graine, & de choiſir un tems calme, afin de pouvoir la répandre également. Il en faut quatre livres pour un arpent.

On peut en ſemer depuis le mois de Mars juſqu'à la fin de Septembre; ſuivant les obſervations faites par pluſieurs cultivateurs, les mois d'Août & Septembre ſont préférables, parce que les mauvaiſes herbes croiſſent beaucoup moins en cette ſaiſon qu'au Printems.

On ne peut trop vanter cette plante; ſon foin eſt très-appétiſſant pour les chevaux, fort ſain, d'un bon odorat & convenable à tous les beſtiaux; elle en produit beaucoup; & s'il venoit des tems pluvieux quand on veut la couper, il ne pourroit arriver aucun dommage par un retard d'un mois, attendu qu'elle repouſſe abondamment de toutes ſes jointures, & ſe tient toujours verte, fraîche, ne pourrit point & ne ſèche point ſur pied comme d'autres fourages.

## La grande Pimprenelle.

La grande Pimprenelle eſt regardée comme un des meilleurs fourages, tant par ſon grand rapport que par ſa qualité; elle eſt nourriſſante & rafraîchiſſante; elle engraiſſe même tous les beſtiaux; on peut leur en laiſſer manger tant qu'ils veulent, ſoit en vert, ſoit en ſec; elle ne leur cauſera ſûrement aucune maladie; les Anglais prétendent qu'elle rend le lait de vache très-délicat; les moutons & les agneaux s'en trouvent auſſi très-bien.

Cette plante eſt vivace; une fois ſemée, elle dure au moins vingt ans; on la voit, pour ainſi dire, repouſſer auſſi-tôt qu'elle eſt coupée, & on peut envoyer le bétail y pâturer, la dent de l'animal ne nuiſant point à cette plante.

La grande Pimprenelle croît dans les terres légères & ſablonneuſes, pierreuſes, calcaires; &c. en un

mot, elle vient dans les plus mauvais terreins, & n'a beſoin d'aucun engrais. On peut la ſemer de Printems & d'Automne ; des perſonnes préfèrent cette dernière ſaiſon, parce qu'elles récoltent la graine au mois de Juillet ſuivant ; au lieu qu'en la ſemant au printems, on n'en récolte la graine que quinze ou ſeize mois aprés.

On a employé deux méthodes pour ſemer la grande Pimprenelle ; les uns l'ont ſemée par ſillons de la profondeur de deux pouces ou deux pouces & demi environ ; le premier de ces ſillons étant fait, on ſème la graine que la charrue recouvre, en formant le ſecond, dans lequel on continue de ſemer la graine, qui ſe trouve recouverte par le troiſième, ainſi de ſuite.

Le champ ſemé, il eſt beſoin de le faire herſer pour couvrir les grains qui ne l'ont point été par le rayon, & afin de rendre le terrein plus uni.

Les autres l'ont ſemée comme l'avoine & herſée de même : cette dernière méthode eſt la plus facile ; &, quoique pluſieurs annoncent des avantages de la première, cette plante a bien réuſſi par l'une & par l'autre.

Il eſt bon, quand on veut ſemer, d'attendre qu'il ſoit tombé un peu de pluie, à moins que la terre n'ait été rafraîchie auparavant, ou qu'elle ne ſoit naturellement humide. On ne doit pas la faire pâturer la première année, ſur-tout ſi l'on veut après la coupe, faire l'opération ſuivante. Elle conſiſte à obſerver ſi la graine a pouſſé pluſieurs brins enſemble ; ſi cela eſt, on les arrache, & on les replante ſeul à ſeul dans un terrein labouré, ayant attention d'en remettre un à la place d'où l'on a tiré les autres, & de regarnir, s'il y avoit du vide.

Quoique cette opération paroiſſe longue, on peut la pratiquer ; une fois faite, c'eſt pour vingt ans, & on s'en trouvera bien dédommagé lorſqu'on verra combien ces plantes profitent iſolées.

La Pimprenelle doit être coupée quatre à cinq fois par

par an; on ne ſauroit cependant rien preſcrire de certain ſur une choſe qui dépend des ſaiſons; on peut la faucher à la hauteur de ſept pouces, parce que plus elle ſera coupée, & plus on aura de produit; cette plante ſe trouve quelquefois avoir repouſſé de plus de ſix pouces un mois après la coupe.

Les récoltes faites, on peut, au bout d'environ trois ſemaines, faire pâturer tant qu'on voudra, même en hiver, en obſervant de ne laiſſer entrer le bétail dans le champ que quand la roſée eſt paſſée; &, lorſqu'on veut avoir la récolte ſuivante en graine, il faut abſolument faire ceſſer de pâturer au mois de Mars. Il faut douze livres de graine pour enſemencer un arpent.

## La Morelle-Truffe.

Nous avons placé cette plante parmi les racines potagères, parmi les fourages & dans l'ordre des grandes cultures: c'eſt qu'en effet on peut la regarder ſous ces trois points de vue. Tous les jardiniers ſavent l'élever comme plante potagère; mais nous croyons faire plaiſir d'indiquer ici la manière de la cultiver à la charrue pour la nourriture des beſtiaux, ou même pour celle des hommes, comme elle y ſert en diverſes contrées, en Angleterre ſous le nom de Patatte, dans le Lyonnois ſous celui de Truffe, en d'autres provinces ſous celui de Pomme de terre, & en Allemagne de Crampir, à l'exemple des anciens Péruviens qui la nommoient Papé ou Papas. Nous devons regarder cette production comme une reſſource d'autant plus grande, que peu de terrein peut fournir à la ſubſiſtance d'une famille nombreuſe. Les racines tubéreuſes de cette plante qui eſt ſa partie la plus utile, eſt auſſi celle qui ſert à la propager. Cette multiplication eſt immenſe comme l'ont fait voir pluſieurs cultivateurs vraiment patriotiques. Ce ſont les petits tubercules qu'on met en terre; quand on n'en a que de gros, on peut les couper par morceaux, de manière qu'il reſte un ou deux yeux à chaque

morceau. Une perſonne qui ſuit le laboureur en a un panier rempli, & les place dans le premier rayon une à une à deux pieds environ de diſtance : celles-ci ſe trouvent recouvertes par le ſecond rayon dans lequel on ne placera point de ces truffes pour laiſſer la diſtance néceſſaire & proportionnée. On en mettra dans le troiſième rayon, & on obſervera le même ordre dans toute la plantation. Une fois en terre, la Morelle-truffe ne demande d'autre ſoin que celui de butter les plantes en Juin ou au commencement de Juillet. Cette opération, qui conſiſte à ramaſſer la terre qui environne le pied autour de la tige juſqu'a la hauteur des premières feuilles, leur ſera très-avantageuſe ; non-ſeulement elle ſoutient les tiges, mais encore elle les empêche de s'élancer, & favoriſe par-la l'accroiſſement des tubercules. Les tiges & les feuilles ſont très-bonnes pour les beſtiaux, les chevaux les mangent bien auſſi lorſqu'ils y ſont accoutumés ; on peut les couper au commencement de Septembre, c'eſt-à-dire, lorſqu'on croit que les racines ont pris leur accroiſſement, & les leur donner en vert ou en ſec. On fait la récolte de ces pommes ou racines au mois d'Octobre ou de Novembre, mais ſur-tout avant les gelées. Ces fruits ſe mangent dans le courant de l'hiver, & ſe donnent aux beſtiaux, ſoit cuits, ſoit crus ; on les garantit de la gelée en les plaçant en cave & en ſerre ; & ſi l'on veut en conſerver de bonnes toute l'année, ſoit pour faire du pain, ſoit pour manger en ragoût ou dans le potage, il faut au printems, quand les germes commencent à pouſſer, les étendre dans un grenier, où, l'air en ayant abſorbé toute l'humidité, le fruit ſe conſervera ſans devenir filandreux, & ne contractera aucun mauvais goût.

La plantation des racines de la Morelle-truffe peut ſe faire depuis la fin de Février juſqu'a la fin d'Avril.

On peut les planter à la houe comme à la charrue, en les mettant à même diſtance & à ſix pouces environ de profondeur.

## La Guede.

On élève beaucoup de cette plante en différentes provinces ſous les noms de Vouëde & de Paſtel pour l'uſage des teintures ; quelques perſonnes l'emploient auſſi pour la nourriture des beſtiaux, & principalement pour les moutons. Ses feuilles leur fourniſſent en hiver un pâturage abondant. On doit la ſemer comme la Rabioule pendant les années de repos, dans les terres à blé qu'elle n'épuiſe pas. On la ſème en Avril ; elle porte ſa graine l'année ſuivante.

## La Rabioule.

La Rabioule du Limouſin n'eſt autre choſe que ce que les Anglois écrivent Turnep, & qu'ils prononcent Turnip. La culture en eſt d'autant plus intéreſſante, qu'elle eſt peu diſpendieuſe, qu'elle ſupplée au fourage pendant l'hiver, & que le bétail ne peut avoir une meilleure nourriture. On a remarqué que les vaches nourries de cette plante en hiver, rendoient du lait en auſſi grande abondance qu'au mois de Mai & d'une qualité ſupérieure. Ces navets deviennent ſi gros, qu'on en a vu de vingt-cinq à vingt-ſept pouces de tour, & qui peſoient ſix à ſept livres. Ils ont de plus la qualité de diviſer & de préparer les terres à recevoir le blé. Un même eſpace de terrein ainſi employé rend beaucoup plus de froment qu'une Jachère ordinaire. Connoiſſant leur groſſeur, on ſaura qu'il ne les faut point ſemer épais ; quatre livres ſuffiſent pour un arpent : ſi au mois d'Août on s'appercevoit qu'ils ne puſſent groſſir pour être trop drus, il faudroit en arracher pour en faciliter l'accroiſſement : les terres légères & amendées ſont celles qui leur conviennent. On les ſème en Juin & Juillet. Sur la fin de Septembre on peut en ôter les feuilles pour les faire manger aux beſtiaux. Les racines ſe récoltent en Octobre, & ſe gar-

dent pour l'hiver en des endroits à l'abri des gelées, afin de les donner aux beſtiaux en les coupant par parties plus ou moins groſſes ſuivant le bétail auquel on en donne.

## De la Spergule.

La Spergule eſt fort cultivée en Allemagne & en Flandres; elle y eſt reconnue pour donner aux vaches une grande abondance de lait, & une qualité ſupérieure au beurre qu'on en fait; elle conſerve les beſtiaux dans le meilleur état; les moutons qui en ſont nourris ont un goût exquis, & les bœufs s'en accommodent également, auſſi-bien que les chèvres.

La graine en outre eſt excellente pour nourrir les pigeons & la volaille pendant l'hiver; elle les fait pondre & multiplier.

Cette plante ſemble nous être donnée par la Providence pour qu'il n'y ait pas un coin de terre inutile: elle croît dans les ſables les plus ſtériles, les graviers les plus arides, les terres les plus âpres, & proſpère dans toutes les eſpèces de craies.

On peut la ſemer dans quelque tems de l'été que ce ſoit; la ſéchereſſe, la dureté du ſol n'y font rien; mais il faut la ſemer en Mars & en Avril pour faire la récolte de la graine qui mûrit en Juillet & Août.

Si l'on ne veut qu'en nourrir les beſtiaux, il ſuffit de la ſemer dans le mois d'Août, ou même après la moiſſon.

Le terrein où on la ſème doit être préparé par un labour; il faut, autant qu'il eſt poſſible, le rendre uni: dix à douze livres de graine ſuffiſent pour enſemencer un acre; on l'enterre avec une herſe d'épine.

## L'Ajonc.

Quoique l'Ajonc ſoit un arbriſſeau, & qu'en cette qualité il ſerve à former de très-bonnes haies, ſes pouſſes tendres & ſucculentes tiennent lieu de fou-

rage pendant l'hiver, dans plusieurs endroits où on l'élève à ce dessein, sous les noms de Jonc-marin ou Jommarin, de Lande, de Genêt épineux. On le sème ordinairement au mois de Mars mêlé parmi les menus grains, dont on fait la récolte dans le tems ordinaire de l'Août; & l'année suivante on coupe ce fourage à mesure qu'on veut le donner aux bestiaux : il faut le hâcher & piler dans des auges pour le leur faire manger. Les chevaux s'en accommodent très-bien. Il faut le couper dès la première année & les suivantes le plus près de terre qu'il est possible, parce que les nouvelles tiges qui se multiplient étant renouvellées dans toute leur longueur, donnent un fourage tendre, toujours vert & succulent, qui est d'autant plus agréable pour le bétail dans l'hiver, que dans cette saison ils sont privés des pâturages. Cette prairie artificielle dure plusieurs années. Quoique l'Ajonc n'épuise point la terre, lorsqu'on veut le détruire, on peut laisser sécher dans le champ la tige & les racines que l'on dégage bien de la terre; on y met le feu, & il en résulte une cendre saline qui produit des effets surprenans dans le terrein où l'on a fait cette opération. Il paroît avantageux de la faire dans l'hiver ou au printems, afin que, par les différens labours, on puisse bien mêler cette cendre précieuse avec la terre qui se trouve bien disposée à recevoir le blé l'automne suivante.

Pour former des haies avec le Jonc-marin, il faut le semer par rayons. On en forme deux ou trois, espacés l'un de l'autre d'environ cinq pouces, & profonds de trois à quatre, dans lesquels on sème la graine par pincée, qu'il est bon de mêler avec les menus grains pour la répandre plus également & moins drue. Cette plante annuelle facilitera sans doute la levée & l'accroissement de l'Ajonc; en le préservant de la grande ardeur du Soleil, elle lui conservera aussi un peu de fraîcheur qui lui sera avantageuse. Les semences étant répandues, elles seront recouvertes par le moyen du rateau, en faisant at-

tention de ne les point trop faire écarter de leur rigolle. On taille ſoigneuſement cette haie la ſeconde année pour faire multiplier les branches dont il faut faciliter l'entrelacement dans le milieu.

## La Luzerne.

Tout le monde connoît la Luzerne & ſon utilité par l'abondance & la bonne qualité de la nourriture qu'elle fournit à tous les beſtiaux. Les lieux où elle ſe plaît davantage ſont les terreins qui ont beaucoup de fond, qui ſont gras & légers; elle ne réuſſit point dans les terres ſèches & arides. On la ſème en Mars & Avril dans le terrein convenable, amélioré par le fumier, ſi on le croit néceſſaire, mais ſur-tout bien préparé & herſé pour le rendre uni, & afin d'en débarraſſer les autres herbes qui pourroient lui nuire : on peut ſemer auſſi la Luzerne à la fin d'Août & en Septembre; elle profite de l'humidité de l'automne pour étendre ſes racines qui pivotent profondément, & il n'y a que la crainte de fortes gelées de l'hiver qui empêche de la ſemer communément en cette ſaiſon, puiſque l'été ſuivant on jouiroit de la récolte.

Les belles ſemences de Luzerne viennent de Provence; il en faut de celles-ci dix-huit à vingt livres à l'arpent, & de celles de ces cantons on en met environ vingt-cinq livres. En la ſemant au printems, il eſt avantageux de la mêler avec demi-ſemence d'avoine pour la préſerver dans ſa levée de l'ardeur du ſoleil qui pourroit lui faire tort; on recoltera cette avoine dans ſa ſaiſon; cependant ſi l'année étoit aſſez abondante pour qu'elle eût beaucoup tallé, il faudroit la couper en vert & la faire manger ainſi aux beſtiaux; les pieds de Luzerne coupés ne manquent pas de repouſſer. Ce n'eſt qu'à la ſeconde année qu'on a à eſpérer de ſa récolte; elle n'eſt même dans toute ſa force qu'à la troiſième; on la coupe trois à quatre fois par an; il faut choiſir pour cela

le plus beau tems & la faire ſécher le plus promptement poſſible en la remuant ſouvent; le tems de la faucher eſt auſſi-tôt qu'elle eſt fleurie. Une Luzernière bien gouvernée dure dix & douze ans; il ne faut point la laiſſer pâturer, la dent de l'animal nuiſant à cette plante, & en défendre l'entrée à la volaille qui lui feroit auſſi du tort.

### La Lupuline ou le Trèfle noir.

Cette eſpèce de Luzerne commune dans les prés, forme ſeule une excellente nourriture pour engraiſſer tous les beſtiaux qui pâturent; c'eſt un fourage qui a la qualité de ne point échauffer ou très-peu. On le fauche trois fois par an, quand il eſt dans un bon terrein, gras & humide. On le ſème au Printems & en Automne; on en met ſix à ſept boiſſeaux à l'arpent; on doit le couper à la fleur pour en faire du foin.

### Le Trèfle de Hollande.

Le Trèfle de Hollande ne demande pas de culture particulière; il ſe ſème au mois de Mars, Avril & commencement de Mai, & pour l'ordinaire ſeul. Il eſt d'autant plus eſtimé, qu'outre la qualité de ſon fourage abondant qui convient à tous les beſtiaux, il améliore ſinguliérement les terres; ſi l'on en met dans un terrein argilleux, & que l'on y ſème du blé après l'avoir détruit, on ſera ſurpris de l'abondante récolte que l'on fera.

Le Trèfle ne dure que trois ans au plus; bien des fermiers ne le laiſſent ſubſiſter qu'une ou deux années, le mettant dans des terreins qu'ils veulent faire repoſer & auxquels il fournit un bon engrais pour le froment que l'on met en place. Le Trèfle ſe coupe trois à quatre fois par an; il faut ſaiſir le moment & profiter du tems le plus ſec pour faire la récolte de ce fourage, vu qu'il contient beaucoup de ſuc

viſqueux, & ſèche en conſéquence difficilement. On prépare la terre comme pour la Luzerne.

## Le Sainfoin.

L'Eſparcette ou le Sain-foin, ainſi nommé parce qu'il eſt appétiſſant, nourriſſant, & très-propre pour engraiſſer les chevaux & les autres beſtiaux auxquels on en donne; il les ragoûte ſinguliérement, & donne beaucoup de lait aux vaches qui en mangent; il faut les accoutumer à le manger en ſec, & ne point le leur donner pour toute nourriture, car il les engraiſſeroit trop. Le Sain-foin eſt d'autant plus eſtimé pour les prairies artificielles, qu'il croît dans tous les terreins. On en fait trois récoltes par an; il y a de l'avantage à le faucher dès la première année, moins pour l'intérêt de la récolte, que, parce qu'en coupant les tiges ſupérieures, les racines tallent ou s'accroiſſent beaucoup plus.

Une prairie dure dix à douze ans daus une terre médiocre, & plus dans un bon terrein. On ſait qu'il a la qualité d'améliorer les fonds ſablonneux à un point que leur rapport en grain ſe trouve étonnant. On le ſème en Mars & Avril après avoir bien préparé la terre, il en faut quinze à dix-huit boiſſeaux par arpent.

## Le Safran.

Les curieux de fleurs cultivent le Safran d'automne comme le printannier dont ils ont pluſieurs jolies variétés; mais le premier fournit une denrée de commerce d'un très-bon rapport, ce qui doit engager à tenter ſa culture tous ceux qui ſe trouveront dans un climat favorable. Le Safran ſe multiplie très-aiſément par le moyen de ſes oignons qui croiſſent tous les ans en quantité. On les plante depuis Mars juſqu'en Juillet; une terre bien ameublie, légere, noire & ſablonneuſe leur convient beaucoup. On les met

en terre à un pouce environ de diſtance les uns des autres dans des ſillons eſpacés d'un demi-pied & profonds de cinq à ſix pouces. On recouvre ces oignons, & s'il ne leur ſurvient point de maladie, on ne leur doit de ſoins que dans la récolte des fleurs, qui ſe fait pour l'ordinaire en Septembre ou Octobre, ſuivant que la ſaiſon eſt plus ou moins avancée.

## L'Alpiste.

L'Alpiſte ſe ſème comme tous les petits grains de Mars en terre bien meuble; il ne demande d'autres ſoins que celui de le préſerver des oiſeaux vers ſa maturité. Son grain, ou mieux encore ſes épis ſont une nourriture très-agréable aux oiſeaux & ſur-tout aux Serins.

## Le Sorgo.

Le Sorgo qu'on a auſſi nommé Millet d'Inde, Millet d'Afrique & gros Mil d'Italie, ſe cultive comme le Millet ordinaire; ſa graine porte plus de profit étant plus groſſe. En Italie on en fait beaucoup d'uſage. Elle ne réuſſit dans ce climat qu'en des lieux naturellement chauds & humides & dans les années favorables. C'eſt une très-bonne nourriture pour les oiſeaux de volière & de baſſe-cour.

## Le Millet et le Panis.

Ces deux Graminées, qui ſervent à-peu-près aux mêmes uſages, exigent la même culture; elles réuſſiſſent bien dans une terre douce & légère : on doit les ſemer fort clair en Avril & Mai, & avoir l'attention de couvrir la ſemence de terre; il faut même éclaircir les pieds un mois après la levée, parce que, s'il n'y avoit pas de diſtance entre les pieds, ils ne profiteroient point & produiroient peu. Dans beaucoup de pays on fait autant d'uſage du Millet mondé que nous en faiſons du Ris. Ici c'eſt la nourriture or-

dinaire des petits oiſeaux. On leur donne le Panis par régal, ſoit en épis, ſoit en grains.

### Le Soucrion.

Se cultive comme l'Orge commune ; ſon grain nud comme celui du Froment eſt particuliérement eſtimé dans certaines provinces.

### Le Froment de Smirne.

On le nomme encore Blé d'abondance, de Providence, de Miracle, ou Froment milliaire. On le ſème comme le Froment ordinaire & dans la même ſaiſon. Ce Blé eſt gourmand & exige un bon terrein. Il mûrit dans les années avantageuſes, quoique ſemé en Mars. Son grain eſt rarement attaqué de la Carie.

### Le Maïs.

Il ſeroit trop long de rapporter ici tous les uſages du Maïs. Ils varient dans chaque province comme ſa culture & ſes noms.

Ici on le nomme Turqui ou Blé de Turquie ; là Blé d'Eſpagne, Milloc ou gros Millet. Dans telle province on fait des gâteaux & même du pain de ſa farine mêlée avec celle de froment ; dans telle autre ce ſont des gaudes, ſorte de bouillie à l'eau & au beurre fort uſitée dans toute la Bourgogne. Les amateurs de nouveautés en ragoûts ont eſſayé de manger le grain vert en petits pois & les épis entiers très-jeunes, en cornichons ou en friture. Mais par-tout on engraiſſe la volaille avec le Maïs : cette nourriture unique les fait profiter à vue d'œil.

Les cochons ne s'en trouvent pas moins bien ; &, ſi l'on en nourrit les pigeons, leur chair ſera blanche, tendre & leur graiſſe ferme & ſavoureuſe. Quant à la manière de le cultiver, on le ſème par rayons, par touffes ou ſeul à ſeul : en général il ſuffit que

la terre ſoit préparée, & qu'il y ait de la diſtance entre chaque plante pour faciliter le binage que l'on doit donner au pied de la tige ; opération qui la fait croître avec plus de vigueur.

Le Maïs eſt gourmand ; & quoiqu'il réuſſiſſe dans preſque tous les terreins, il fait cependant beaucoup mieux dans une terre graſſe naturellement ou amendée. Lorſque les feuilles ſont grandes, on en coupe une partie, & même le ſommet de la tige qui porte l'épi mâle défleuri, afin que la plante prenne plus d'air. Le tems de le ſemer eſt en Mars & Avril, & celui de la récolte à la fin de Septembre.

## La Garance.

Le bon produit que l'on tire de la culture de la Garance eſt aujourd'hui auſſi généralement reconnu que ſon utilité dans les teintures.

Cette plante réuſſit très-bien dans les terres douces & légères ; un ſol humide ne l'eſt point trop, ſi l'eau n'y croupit point ; une bonne terre ſabloneuſe ſur un fond de glaiſe lui convient ſur-tout beaucoup : on ne perdra jamais de répandre des fumiers dans les Garancières ; on a vu cette plante très-bien réuſſir dans des terres très-arides améliorées avec le fumier de bœuf & de vache.

Si l'on veut ſemer la Garance dans un terrein cultivé, on lui donne le même labour que pour le froment ; ſi au contraire on ſe propoſe d'en mettre dans une terre en friche, il faut lui donner pluſieurs labours, d'abord deux avant l'hiver, afin qu'elle ſe trouve ameublie par les gelées, & en état de recevoir la ſemence en Mars ou Avril, ſuivant que la ſaiſon le permettra, après lui avoir donné un nouveau labour & même deux, ſi la terre ne paroiſſoit pas ſuffiſamment briſée, l'un deſquels ſeroit fait dans les tems les plus favorables ſur la fin de l'hiver. On met deux boiſſeaux de graine par arpent, & il y a des terreins où il ſuffit d'un boiſſeau & demi ; la ſemence

répandue, il faut herſer la terre; & quand la plante eſt levée, ſarcler dans le beſoin pour ôter les autres herbes; on récolte la graine la première année, & on butte après chaque pied d'un peu de terre; l'année ſuivante on fait une autre récolte de graine, & vers le mois de Novembre qui ſuit cette ſeconde récolte, on arrache ſes plus groſſes racines, les autres ſe récoltent l'année ſuivante; & ſans faire tort à la vente on peut en tirer de petits tronçons garnis chacun d'un tubercule pour en faire de nouvelles plantations.

## La Soyeuse.

C'eſt une eſpèce d'Apocin : on lui a donné les noms d'Ouatte & de Soyeuſe par rapport aux aigrettes qu'on trouve dans ſes fruits, dont on fait de la ouatte, & qu'on a trouvé le moyen de filer mêlée avec de la ſoie depuis quelques années, pour en fabriquer diverſes étoffes. Cette plante, qui eſt vivace, s'accomode des plus mauvais terreins; on ſème de la graine au Printems, & après les premières années, elle ne demande plus aucune culture, produiſant tous les ans d'abondantes récoltes.

## Le Colsa.

C'eſt une eſpèce de chou fort cultivé en Flandre, où il fait un objet conſidérable de commerce. On fait de l'huile avec ſa graine comme avec la navette. Les pains dont on a exprimé l'huile, ſervent à engraiſſer les beſtiaux de toute eſpèce. On leur fait manger auſſi la menue paille du Colſa qui ſort du van. Il ſe ſème au Printems, & demande une bonne terre qui ait du fond ou qui ſoit bien amendée par les engrais. On replante le Colſa comme les choux à ſix pouces de diſtance par rangées eſpacées d'environ un pied.

## Le Lin de Riga.

Tout le monde connoit l'utilité du Lin, & peu de perſonnes en ignorent la culture. Il faut le ſemer dant le mois de Mars, & choiſir, autant qu'il eſt poſſible, un beau tems. Il demande une terre graſſe, point trop humide & bien ameublie qu'il eſt néceſſaire de nétoyer exactement de toutes racines & herbes. La graine ſemée fort clair, il faut herſer la terre, & y paſſer le rouleau pour la reſſerrer. Dès que le Lin a deux pouces de hauteur, il faut le ſarcler ſoigneuſement, & continuer juſqu'à ce qu'il en ait environ ſix. La meilleure graine de Lin vient de Riga, & c'eſt celle que nous fournirons aux cultivateurs. Il ne faut l'arracher que lorſqu'il eſt près de ſa maturité; car trop vert, ſa filaſſe en eſt plus groſſe, & elle tombe beaucoup en étoupe.

## Le Chanvre de Piémont.

Se cultive comme le chanvre ordinaire, ſi ce n'eſt qu'il doit être fort eſpacé, car il monte à la hauteur de ſept à huit pieds, & étend ſes branches a proportion : il devient ligneux, de manière que les tiges des portes-graines ſervent à former des cannes de promenade. Le bas du tronc eſt recherché par les horlogers qui s'en ſervent à polir leurs ouvrages. Son plus grand uſage vient de ſa graine qu'il fournit dans une abondance prodigieuſe.

## Maniere de semer les beaux Gazons.

Le beau Gazon vient des graines des bas prés. Avant de le ſemer, il faut ôter toutes les mottes & les pierres; bien labourer le terrein; paſſer la terre au rateau fin, & répandre uniment ſur ſa ſurface un ou deux pouces de bonne terre, cela y fera trés-bien. Enſuite ſemer la graine par un tems couvert, & la

recouvrir avec le rateau. On n'évite, pour ſemer les gazons, que les grandes ſéchereſſes & les grands froids; les ſaiſons du printems & de l'automne ſont préférables. On doit les faucher quatre à cinq fois par an, & de fort près, afin que l'herbe ſoit toujours épaiſſe & raze.

Si on a le ſoin d'y faire ſemer tous les ans de nouvelles graines, le gazon ne s'altérera jamais, étant ainſi renouvellé, & ſera toujours des plus beaux.

## Le fin Houssi.

C'eſt un petit Trèfle fort joli que l'on emploie beaucoup en Angleterre pour former des tapis d'agrément; il ſe ſème au printems comme le grand Trèfle, lorſqu'on a bien préparé la terre qu'il faut après unir autant qu'il ſera poſſible. Si l'on coupe ſouvent ce gazon, il eſt toujours d'un vert le plus gai. Mais ſi l'on veut jouir de l'agrément de ſes fleurs qui flattent beaucoup, la plante en durera moins. On met environ trente livres de graine à l'arpent.

## *RECETTE du RATAFIA DE FLEURS DE MOLDAVIQUE, nommée LE NÉPENTES.*

LORSQU'ON veut élever la Moldavique pour l'ornement des jardins en automne, on peut ne la ſemer qu'en Avril ; mais il faut la ſemer dès le mois de Mars ſur couche, pour récolter ſes fleurs dans l'été, quand on en veut faire de bon Ratafia.

On doit cueillir cette fleur à midi dans de beaux jours, la dépouiller de ſon calice, & la mettre auſſitôt infuſer au ſoleil dans de l'eau de vie, ayant ſoin de remplir la bouteille à meſure qu'on ajoute des fleurs.

Deux mois après, paſſez la liqueur dans une chauſſe & preſſez le marc. Meſurez la quantité de cette infuſion, & prenez pareille quantité d'eau-de-vie pure : peſez vingt onces de ſucre par pintes de Paris ; faites clarifier le ſucre dans une poële ſur un fourneau à grand feu de charbon. Lorſqu'il eſt réduit en ſirop, jettez dans la poële l'infuſion & l'eau-de-vie ; laiſſez bouillir le tout enſemble quelques bouillons, & quand la liqueur eſt refroidie, paſſez-la dans une toile neuve & ſerrée, laiſſez-la refroidir dans un vaiſſeau de fayence couvert d'un papier & de linge, puis mettez-la dans les bouteilles que vous ne boucherez que le lendemain.

Quoique par ce procédé on ſemble ôter beaucoup de force au Ratafia, il lui en reſte aſſez pour le rendre une liqueur très-agréable & très-ſalutaire. Au reſte, on ſait que la Moldavique a toutes les propriétés de la Méliſſe.

## *RECETTE du Ratafia des Sept-Graines.*

Prenez de la graine d'Anis, d'Anet, de Carvi, de Coriandre, de Carotte & de Fénouil, de chacune une once & deux gros d'Angélique muſquée : faites infuſer ces ſept graines aromatiques dans quatre pintes d'eau-de-vie dans une bouteille de verre ou une cruche pendant le tems de quinze jours en été, ou de trois ſemaines en hiver, avec le ſoin de remuer la bouteille tous les jours pour empêcher la liqueur de ſe graiſſer, & celui de l'expoſer au ſoleil s'il eſt poſſible. Paſſez l'infuſion à la chauſſe, ajoutez-y ſix onces ou même demi-livre de ſucre par pinte de liqueur, fondu dans demi-ſeptier d'eau, & repaſſez le tout à la chauſſe une ſeconde fois. Ce Ratafia très-connu & très-eſtimé peut ſe faire en tout tems : on trouvera même chez le ſieur Andrieux leſdites graines criblées & mêlangées toutes prêtes à infuſer, & l'on peut être aſſuré de les avoir toujours fraîches & de la meilleure qualité.

# CATALOGUE
## RAISONNÉ
### DES MEILLEURES SORTES
### D'ARBRES FRUITIERS,

*Dont le Sieur* ANDRIEUX, *Marchand Grainier-Fleuriſte & Botaniſte du Roi, à Paris, quai de la Mégiſſerie, près l'Arche Marion,* au Roi des Oiſeaux, *procurera des Greffes ou de jeunes Sujets greffés dans les ſaiſons convenables.*

# *AVERTISSEMENT.*

Les noms françois des Arbres que comprend ce Catalogue ſont les plus uſités & ceux que M. Duhamel a adoptés dans ſon Traité des Arbres fruitiers imprimé à Paris en 1769, deux volumes *in*-4°. grand papier ; on y verra dans les planches le portrait fidèle des principales eſpèces & la deſcription détaillée de toutes. Celle que nous donnons ici en eſt extraite, ainſi que les phraſes latines qu'on a miſes en marge.

Nous avons cru faire plaiſir de les ranger dans l'ordre de leur maturité ; mais il eſt néceſſaire d'obſerver que cet ordre eſt celui que garderoient ces fruits cultivés dans un même ſol & en pareille température ; de ſorte que la

différence des terreins & des expoſitions produit ſouvent de grandes différences dans leur maturité.

# CATALOGUE
## RAISONNÉ
## DES MEILLEURES ESPECES
## D'ARBRES FRUITIERS

*Indiqués dans le Traité des Arbres fruitiers de M.* DUHAMEL, *& dont le Sieur* ANDRIEUX *procurera du Plant ou des Greffes dans les Saiſons convenables avec toute ſûreté pour la franchiſe de l'eſpèce.*

---

## LES VIGNES.

*Le Morillon hatif, ou Raisin précoce, ou Raiſin de la Magdeleine.* Il doit tout ſon mérite à ſa précocité. Ses grappes ſont petites, bien garnies de petits grains, dont la peau un peu dure eſt d'un violet noir. Leur chair eſt verdâtre & leur eau preſque inſipide. Il a pluſieurs variétés qui ne diffèrent que par la couleur.

Vitis acino parvo ſubrotundo, nigricante, præcoci.

Vitis acino medio rotundo, ex albido flaveſcente.

*Le Chasselas*, *Chaſſelas doré*, *ou Bars-le-Chaſſelas*, *ou Bar-ſur-Aube blanc* eſt le Raiſin le plus commun dans nos jardins. Sa grappe eſt groſſe; ſes grains ronds de groſſeur inégale, couverts d'une peau dure d'un jaune pâle, quelquefois ambrée, qui renferme une chair fondante pleine d'une eau très-douce, ſucrée, excellente.

Vitis acino medio, rotundo, rubello.

*Le Chasselas rouge* eſt une variété du précédent, dont le grain eſt un peu moindre, & lavé de rouge clair ſur un côté.

Vitis acino medio, rotundo, albimoſchato.

*Le Chasselas musqué.* C'eſt une autre excellente variété de Chaſſelas, dont le grain eſt des mêmes forme & groſſeur, la peau d'un vert pâle, & l'eau relevée d'un petit parfum de muſc fort agréable.

Vitis folio laciniato, acino medio, rotundo, albido.

*Le Cioutat*, *Ciotat ou Raiſin d'Autriche* eſt un vrai Chaſſelas, dont la grappe eſt moindre & moins garnie de grains que celle du Chaſſelas doré. La feuille de cette vigne eſt palmée ou laciniée en cinq piéces découpées profondément.

Vitis apiana acino medio, ſubrotundo, albido, moſchato.

*Le Muscat blanc.* Il a la grappe preſque conique. Ses grains ſont alongés, leur peau croquante, d'un vert clair, un peu ambrée du côté du ſoleil. La chair aſſez ferme eſt pleine d'une eau muſquée, excellente, lorſque ce raiſin peut acquérir une parfaite maturité : c'eſt le plus commun des Muſcats.

Vitis apiana acino medio, rotundo, rubro, moſchato.

*Le Muscat rouge.* La grappe du *Muſcat rouge* eſt de même forme que celle du Muſcat blanc. Les grains, moins ſerrés, ſont ronds, les uns d'un rouge vif, les autres mêlés de jaune & de rouge clair. La chair eſt ferme, & l'eau muſquée eſt agréable.

Vitis apiana acino magno, oblongo, violaceo, moſchato.

*Le Muscat violet* a les grains plus gros, alongés, la peau plus dure, d'un violet foncé, la chair verdâtre, l'eau muſquée, moins agréable que les deux précédens.

*Le Muscat noir*, inférieur en bonté à tous les autres Muſcats, eſt de groſſeur moyenne, d'un violet tirant ſur le noir; ſa chair en eſt un peu teinte; ſon eau eſt muſquée.

Vitis apiana acino medio, ſubrotundo, nigricante, moſchato.

*Le Muscat d'Alexandrie, ou Paſſe-longue muſquée.* Ses grappes ſont de même forme que celles des autres Muſcats. Son grain eſt ovale, fort gros, couvert d'une peau dure, d'un vert tirant ſur le jaune. Sa chair blanche & ferme eſt pleine d'une eau muſquée & excellente. Mais ce raiſin a peine à murir aux expoſitions même les plus chaudes.

Vitis apiana acino maximo, ovato, e viridi flaveſcente, moſchato, Alexandrina.

*Le Raisin de Maroc*, plus agréable à l'œil qu'au goût, eſt fort gros, ovale. Sa peau eſt dure, d'un violet foncé. Son eau aigre avant ſa maturité devient alors inſipide. La grappe eſt très-groſſe. Sa varieté à fruit blanc, & *le Maroquin* ou *Barbarem* ne valent pas mieux.

Vitis acino maximo, ovato, ſaturè violaceo.

*Le Cornichon blanc.* Sa grappe ne contient pas un grand nombre de grains, qui ſont très-longs, renflés au milieu, courbés, imitant la forme d'un petit cornichon. La peau en eſt dure, d'un vert très-pâle : l'eau douce, ſucrée, fort bonne, lorſque ce raiſin peut mûrir. Il a une variété de couleur violette, qui mûrit encore plus difficilement.

Vitis acino longiſſimo cucumeri formi albido.

*Le Bourdelas, Bordelais* ou *Verjus*, a des grappes extrêmement groſſes. Les grains ſont oblongs, couverts d'une peau très-dure, d'un vert clair tirant ſur le jaune. La chair en eſt aſſez ferme; l'eau abondante & acide devient douce & agréable dans la maturité; mais on ne l'emploie guère que vert en ce pays. Ses deux variétés à *fruit rouge* & à *fruit noir* n'en diffèrent que par la couleur.

Vitis acino majore, ovato, e viridi flaveſcente, Burdigalenſis dicta.

*Le Corinthe blanc* a la grappe fort alongée, bien garnie de grains très-petits, ronds ſans pepins,

Vitis acino minimo ro-

tundo, albido, sine nucleis, Corinthia. de la même couleur que le Chasselas blanc, d'une eau sucrée & fort agréable. Ses deux variétés, *rouge* & *violette*, sont moins bonnes & plus sujettes à couler.

## LES AMANDIERS.

Amygdalus sativa fructu minori. *C. A. P.* L'*Amandier a petit fruit*. Quoique cet Amandier, qui est le plus commun dans nos jardins, ait l'Amande douce, la petitesse de l'Amande & la dureté de la coque le rendent peu propre aux usages économiques. Les Pépiniéristes en sèment les fruits pour former des sujets propres à recevoir la greffe de différens arbres. Il a une variété dont l'Amande est amère.

Amygdalus dulcis putamine molliore. *C. B. P.* L'*Amandier des Dames*, *Amandier à coque tendre* ou *à noyau tendre*. Il produit des fruits un peu plus gros que le précédent, & est très-estimable par la douceur de son amande & la fragilité de son noyau.

Amygdalus dulcis fructu majori. L'*Amandier a gros fruit*, *dont l'Amande est douce*, mérite le plus d'être cultivé dans notre climat, où il réussit bien. Ses fruits donnent des sujets pour les pepinières beaucoup meilleurs que l'Amande douce commune. La douceur, la fermeté & le volume de ses Amandes les fait rechercher tant vertes que séches. Il a une variété dont l'Amande est amère.

Amygdalus Persica. L'*Amandier-Pecher*, ou *Amandier-Pêche*. Il participe des deux arbres dont il porte le nom. Son fruit nommé aussi Pêche-Amande, est quelquefois couvert d'un brou sec & mince comme celui des Amandes, d'autrefois d'une chair épaisse & succulente comme les Pêches; mais l'eau en est amère. Le noyau des uns & des autres est gros & lisse & contient une Amande douce.

# LES PECHERS.

*L'Avant-Peche blanche.* La chair de cette Pêche eſt blanche, fine & ſucculente ; ſon eau eſt très-ſucrée, elle a un parfum muſqué qui la rend très-agréable ; elle eſt très-hâtive, puiſqu'elle mûrit quelquefois dès le commencement de Juillet.

Perſica flore magno, precoci fructu, albo minori.

*L'Avant-Pecher rouge*, ou *Avant-Pêche de Troyes.* Elle mûrit au commencement d'Août aux bonnes expoſitions ; ſa chair eſt blanche, fine, fondante ; ſon eau eſt ſucrée & muſquée.

Perſica flore magno fructu æſtivo, rubro, minori.

*L'Avant-Peche jaune.* Sa chair eſt d'un jaune doré, elle eſt fine & fondante ; ſon eau eſt douce & ſucrée.

Perſica æſtiva flore parvo, fructu minori, carne flaveſcente.

*La double de Troyes*, ou *Pêche de Troyes, dite Petite Mignone.* Ce fruit eſt au nombre des bonnes Pêches, ſa chair eſt ferme, fine, blanche ; ſon eau abondante, un peu ſucrée & vineuſe ; il mûrit vers la fin d'Août.

Perſica æſtiva flore parvo ; fructu mediocris craſſitiei ; trecaſſina dicta.

*La Peche-Madeleine blanche.* Sa chair & ſa peau ſont également blanches, & cette chair eſt délicate, fine, fondante & ſucculente ; ſon eau abondante, ſucrée, muſquée & d'un goût fin. Elle commence à mûrir vers la mi-Août.

Perſica flore magno, fructu globoſo, compreſſo ; albis carne & cortice.

*La véritable Pourprée hative a grande fleur.* Cette belle Pêche regardée comme une des meilleures mûrit dans le commencement d'Août ; ſa couleur eſt d'un rouge foncé & ſa forme bien ronde ; ſa chair eſt fine & très-fondante, ſon eau abondante & délicieuſe.

Perſica fructu globoſo, æſtiyo, obſcurè rubente, carne aquoſâ ſuaviſſimâ.

Perſica flore parvo, fructu mediocris, carne flaveſcente.

*L'Alberge jaune*, ou *Pêche jaune.* Sa chair eſt très-fondante quand le fruit eſt bien mûr, & que l'arbre ſe porte bien; ſon eau eſt ſucrée & vineuſe: elle mûrit à la fin d'Août.

Perſica fructu globoſo, carne buxeâ, muleo adherente, cortice obſcurè-rubente.

*Le Pavie-Alberge, Perſais d'Angoumois.* Ce fruit eſt excellent & mûrit à la fin de Septembre; ſa chair eſt jaune couleur de buis, fondante & tient au noyau; ſa peau eſt colorée d'un rouge obſcur.

Perſica flore parvo; fructu æſtivo compreſſo, paululùm verrucoſo.

*La Chevreuse hative.* Elle a la chair fondante; ſon eau eſt douce & ſucrée. Cette Pêche mûrit à la fin d'Août. Il y a une variété de cette eſpèce nommée *Pêche d'Italie* qui abonde en eau, & dont le fruit eſt un peu plus gros & plus tardif.

Perſica flore magno; fructu æſtivo globoſo, obſcurè-rubente ſuaviſſimo.

*La Pourprée hative*, ou *Vineuſe.* Cette Pêche paroît être une variété de la groſſe Mignone; elle mûrit au même tems; ſa chair eſt fine, blanche, ſucculente; elle abonde en eau vineuſe.

Perſica flore magno; fructu globoſo, pulcherrimo, ſaturè rubro.

*La Mignone, Groſſe Mignone, Veloutée de Merlet.* Ce fruit eſt bien rond & d'un rouge vif; ſa chair eſt fine, fondante, ſucculente & fort délicate; ſon eau eſt ſucrée, relevée, vineuſe: ſa maturité eſt ſur la fin d'Août.

Perſica flore magno, fructu paululùm compreſſo, cortice rubro, carne venis rubris muricatâ.

*La Madeleine rouge*, ou *Madeleine de Courſon.* Cette Pêche eſt au nombre des meilleures, ayant une eau ſucrée & d'un goût relevé très-agréable: elle mûrit en Septembre: ſa forme eſt un peu applatie, ſa peau rouge & ſa chair veinée de la même couleur. *La Madeleine tardive*, qu'on croit être une varieté de la précédente, ne mûrit qu'en Octobre & Novembre; elle eſt auſſi très-bonne.

Perſica flore parvo; fructu æſtivo, compreſſo, paululùm verrucoſo.

*La Belle Chevreuse.* Sa chair eſt aſſez ferme, ſon eau ſucrée & aſſez agréable; cette Pêche mûrit dans le commencement de Septembre.

*La Bellegarde* ou *Galande.* Cette Pêche mûrit à la fin d'Août; elle eſt aſſez groſſe, ronde & d'un rouge foncé; ſa chair eſt ferme & caſſante; cependant fine, pleine d'eau ſucrée & de très-bo goût. .—

Perſica flore parvo; fructu magno, globoſo, atro-tubente, carne firmâ, ſaccharatâ.

*Le Pavie blanc* ou *Pavie-Madeleine.* Sa chair, qui tient au noyau, eſt ferme, ſucculente, abondante en eau & très-vineuſe dans ſa parfaite maturité qui arrive au commencemeut de Septembre.

Perſica flore magno, fructu albo, carne durâ, muleo adhærente.

*La veritable Chancelière à grande fleur.* Cette Pêche eſt excellente, elle mûrit au commencement de Septembre; on remarque quelques verrues ſur ſa peau qui eſt d'un rouge gai.

Perſica flore magno; fructu minùs æſtivo, paululùm verrucoſo, dilutè rubente.

*La Prche Malthe.* Sa chair eſt fine, ſon eau un peu muſquée & très-agréable dans ſa maturité; cette Pêche un peu applatie a la peau rouge & la chair blanche.

P. fl. mag. fr. amplo, ſerotino, compreſſo, cortice paululùm rubente, carne albâ.

*La Peche-Cerise.* Ce fruit eſt très-agréable à la vue par ſes belles couleurs; il eſt liſſe & coloré en partie de rouge & de blanc; ſa chair eſt aſſez fine & fondante : il mûrit au commencement de Septembre.

Perſica flore parvo, fructu glabro æſtivo, carnealbâ, cortice partim albo, partim dilutè rubente.

*La petite Violette hative.* L'eau ſucrée, vineuſe & parfumée de cette Pêche la rend une des meilleures; elle mûrit au commencement de Septembre. On ſait que toutes les Pêches qu'on nomme *Violettes* ont la peau liſſe.

Perſica flore parvo, fructu glabro, violaceo, minori vinoſo.

*La grosse Violette hative.* Sa chair eſt fondante, moins vineuſe que celle de la précédente; ce fruit eſt auſſi très-bon; il mûrit au commencement de Septembre.

Perſica flore parvo, fructu glabro violaceo, majori vinoſo.

*La Bourdine*, ou *Pêche-Bourdin, Narbonne,* Perſica flore

parvo, fructu globoſo, pulcherrimo, atro-rubente.

Cette Pêche bien faite, & que ſon rouge-brun rend très-agréable, ſe trouve mûre en Septembre; ſa chair eſt très-fine, fondante; ſon eau vineuſe & d'un goût excellent.

Perſica flore parvo; fructu magno, globoſo, dilutè-rubente, carne firm â ſaccharatâ.

*L'Admirable.* Ce fruit eſt bien nommé; il eſt gros, bien rond, d'un rouge gai; ſa chair eſt ferme, fine, fondante; ſon eau eſt douce, ſucrée, d'uu goût vineux, fin & relevé qui eſt admirable : il mûrit à la mi-Septembre.

Perſica flore parvo, fructu magno, carne flaveſcente.

*La Rossanne.* La Pêche de Roſſanne paroît être une variété de l'Alberge jaune, ayant les mêmes qualirés, excepté ſa ſaiſon; elle eſt auſſi plus groſſe.

Perſica flore parvo, fructu magno, globoſo, dilute-rubente, venio purpureis muricato; carne firmâ & ſuaviſſimâ.

*La Belle de Vitry*, ou *Admirable tardive.* La chair de cette Pêche eſt ferme & ſucculente; elle mûrit à la fin de Septembre; il faut la laiſſer paſſer quelques jours dans la fruiterie avant de la manger; alors elle a un goût relevé & une eau délicieuſe; elle eſt groſſe, ronde, d'un rouge gai, fouettée de veines pourprées.

Perſica flore medio, fructu magno, globoſo, ſuave-rubente; ſapore gratiſſimo.

*Le Teindou ou Tein-doux.* Ce fruit eſt gros, bien rond, d'un beau rouge; il a la chair fine, l'eau ſucrée & bien délicate, le tems de ſa maturité eſt vers la fin de Septembre.

Perſica flore parvo, fructu vix-globoſo, dilute rubente, papillato, carne gratiſſimâ.

*Le Teton de venus.* C'eſt une Pêche preſque ronde, à l'exception d'uue pointe qui ſe voit à l'extrêmité. Elle a la peau de couleur rouge gai; ſa chair eſt fine & fort agréable, ſon eau a un parfum admirable; elle mûrit à la fin de Septembre.

Perſica flore parvo, fructu ſerotino compreſſo.

*La Chevreuse tardive ou Pourprée.* Sa maturité ſuit la précédente; cette Pêche eſt bonne & fort agréable, ſa forme eſt un peu applatie.

Perſica flore magno, fruc-

*Le Brugnon violet musqué.* Sa chair, quoique ferme & adhérente au noyau, eſt aqueuſe, d'un

goût excellent, vineuſe, muſquée & ſucrée; il mûrit à la fin de Septembre, ſa peau eſt liſſe comme celle des autres Pêches violettes.

tuglabro, violaceo, vinoſo, carne nucleâ adhærente.

*Le Pecher à fleur ſemi-double.* Les Pêches qu'il donne ont la chair blanche & une eau agréable; elles mûriſſent auſſi à la fin de Septembre.

Perſica flore magno ſemipleno.

*La Royale.* Ce fruit a la chair fine, l'eau ſucrée, relevée d'un goût vineux agréable; il mûrit vers la fin de Septembre, ſa forme eſt un peu alongée, & ſa couleur foncée.

Perſica flore parvo, fructu paululùm oblongo, atrerubenteſerotino.

*La Nivette veloutée.* Sa chair ferme eſt ſucculente; ſon eau eſt ſucrée & relevée; mais pour avoir ces bonnes qualités, il faut lui laiſſer paſſer quelques jours à la fruiterie.

Perſica flore parvo fructu maguo globoſo, dilute-rubente, ſerotino.

*La Violette tardive* qu'on nomme auſſi *marbrée & panachée.* Lorſque cette Pêche eſt dans ſa maturité, ſon eau eſt très-vineuſe; mais comme elle ne mûrit que vers la mi-Octobre, elle ne réuſſit que dans les Automnes chauds.

Perſica flore parvo; fructu glabro e rubro & violaceo variegato, ſerotino, vinoſo.

*La Madeleine tardive.* Cette Pêche qu'on regarde comme une variété de la Madeleine de Courſon ne mûrit qu'en Octobre & Novembre; elle eſt auſſi très-bonne.

P. fl. mag. fr. paululùm compreſſo, cortice rubro, carne venis rubris muricatâ.

*La Pourprée tardive.* Ce fruit eſt fort ſucculent, ſon eau douce & d'un goût relevé.

Perſica flore parvo, fructu ſerotino, globoſo, obſcurè-rubente ſuaviſſimo.

*La Peche Perſique.* Sa chair eſt ferme & néanmoins ſucculente, ſon eau eſt d'un goût fin, relevé, très-agréable; elle eſt vraiment excellente; cette Pêche mûrit auſſi en Octobre & Novembre.

Perſica flore parvo fructu oblongo, colorato, verrucoſo, ſerotino, carne firmâ vinoſâ.

Perſica flore magno, fructu maximo, pulcherrimo, carne durâ, nucleo adhærente.

*Le Pavie rouge de Pompone*, *Pavie monſtrueux*, ou *Pavie camus*. Si l'Automne eſt chaud, l'eau de ce beau fruit eſt vineuſe, muſquée, ſucrée & très-agréable, & ſa chair, quoique bien ferme, eſt ſuccu-lente.

Perſica flore amplo, fructu magno, globoſo, ſerotino, carne buxeâ.

*L'Admirable jaune*, *abricotée*, *Pêche d'abricot*, ou *groſſe Pêche jaune tardive*. Son eau eſt agréable dans les Automnes chauds; elle eſt mêlée d'un peu de parfum de l'abricot; ſa chair en a auſſi la cou-leur.

Perſica fructu maximo, compreſſo, carne durâ, nucleo adhærente, buxeâ.

*Le Pavie jaune*. Cette Pêche a, comme on ſait, la chair ferme qui ne quitte pas le noyau; c'eſt un fort bon fruit qui a les qualités de l'Admirable jaune; ſa chair eſt un peu moins ferme, mais il eſt plus gros.

Perſica flore parvo, fructu globoſo, glabro, ſerotino buxeo colore, mali armeniaci ſapore.

*La Jaune liſſe*, ou *Liſſée jaune*. Sa chair eſt ferme; lorſque les Automnes ſont favorables, ſon eau eſt ſucrée, très-agréable, & a un petit goût d'a-bricot; cette Pêche, quoique mûre, ſe conſerve quinze jours ſans perdre ſa qualité.

Perſica flore magno; cortice & carne rubris, quaſi ſanguineis.

*La Peche Sanguinole*, dite *Beterave* ou *Dru-ſelle*. Toute ſa chair eſt rouge comme la Betterave & un peu ſèche; cette Pêche curieuſe n'eſt point bonne crue, mais elle eſt parfaite en compotte. *La Cardi-nale* tient beaucoup de cette dernière; mais elle eſt plus groſſe & meilleure.

Perſica Pa-lenſis.

*La Peche de Pau*. Il faut des Automnes chauds pour que cette Pêche qui, eſt fort tardive, mûriſſe parfaitement; alors elle a la chair fondante, l'eau relevée & agréable.

Perſica flore parvo, fructu glabro, ferè

*La Violette très-tardive*, dite *Pêche-noix*. Pour que cette Pêche mûriſſe, il lui faut, comme à la précédente, un Automne favorable; elle reſſem-

ble en tout à la violette tardive; ſa chair a une foible teinture de verd. viridi, maxime ſerotino.

*Le Pecher nain.* Il eſt moins utile par ſon fruit que curieux par la petiteſſe de l'arbre que l'on élève ſouvent dans un vaſe pour le ſervir ſur la table. Perſica nana, frugifera, flore magno ſimplici.

## LES CERISIERS.

*Le Merisier a gros fruit noir.* Son fruit beaucoup plus gros a la chair tendre & rouge, une eau fort colorée, abondante, douce & ſucrée; il eſt très-employé pour les liqueurs. Ceraſus major ac ſilveſtris multiplici flore.

*Le Merisier a fleur double.* On le cultive pour la beauté de ſa fleur qui s'épanouit à la fin d'Avril; mais il ne donne point de fruit. Ceraſus major ac ſilveſtris multiplici flore.

## Les Guignier s.

*Le Guignier a fruit noir.* Cette Guigne mûrit dans le commencement de Juin; mais on la cueille ſouvent avant ſa parfaite maturité; alors ſa chair eſt ferme & rouge, & ſon eau aſſez agréable quoiqu'un peu ſure. Ceraſus major hortenſis fructu cordato, nigricante, carne tenerâ & aquoſâ.

*Le Guignier a petit fruit noir.* Cet arbre eſt une variété du précédent; il n'en diffère que par ſon fruit moins gros & d'une chair moins foncée en rouge. C. maj. hort. fr. cordato minore, nigric. carne aquoſâ ſubdulci.

*Le Guignier a gros fruit blanc.* Quoique cette Guigne ſoit nommée blanche, elle eſt cependant en partie rougeâtre, ſa chair eſt moins tendre que celle de la Guigne noire, ſon eau a un goût fort agréable, elle mûrit vers la mi-Juin. C. maj. hort. fr. cordato, partim albo, partim rubro, carne tenerâ & aquoſâ.

C. maj. hort. fr. cord. nigro ſplendente, carne tenerâ; aquoſâ & ſapidiſſimâ.

*Le Guignier à gros fruit noir luiſant.* La chair de cette Guigne eſt ferme, rouge; ſon eau eſt abondante, d'un goût relevé & agréable; elle mûrit à la fin de Juin.

C. maj. hort. fructu, cordato, rubro, ſerotino, carne tenerâ & aquoſâ.

*Le Guignier à fruit rouge tardif.* Le ſeul mérite de cet arbre eſt de donner ſon fruit en Septembre & Octobre; c'eſt ce qu'on nomme *la Guigne de Saint-Gilles* ou *la Guigne de fer.*

## Les Bigarreautiers.

Ceraſus major hortenſis fructu cordato minore, hinc albo, inde, dilut rubro, carne durâ dulci.

*Le Bigarreautier à petit fruit hâtif.* Le petit Bigarreau hâtif a la chair caſſante, moins ferme cependant que les autres; ſon eau d'abord un peu ſure s'adoucit & prend un goût relevé dans ſa parfaite mâturité : il commence dès la mi-Juin.

C. maj. hort. fructu cordato minore rubro, carne durâ dulci.

*Le Bigarreautier à petit fruit rouge hâtif.* Variété du précédent; il n'en diffère que par ſa couleur, ſa chair un peu plus ferme & ſon eau un peu plus relevée.

Ceraſus major hortenſis fructu cordato medio, carne durâ ſapidâ.

*Le Bigarreautier commun.* Sa chair eſt ferme & caſſante, ſon eau abondante, vineuſe, relevée & très-agréable; le Bigarreau ordinaire mûrit au commencement de Juillet, & pour être commun, il n'en eſt pas moins excellent.

C. maj. hort. fructu cordato majore ſature rubro, carne durâ ſapidiſſimâ.

*Le Bigarreautier à gros fruit rouge.* Ce Bigarreau, le meilleur de tous, a la chair ferme & fort ſucculente, une eau abondante, d'un goût très-relevé & excellent : il mûrit vers la fin de Juillet.

C. maj. hort. fructu cordato majore, hinc albo, inde dilute rubro, carne pidâ.

*Le Bigarreautier à gros fruit blanc.* Son fruit qui n'eſt qu'en partie blanc & en partie d'un rouge tendre, n'a pas le goût auſſi relevé.

Les

LES CERISIERS, *proprement dits à fruits ronds.*

*LE CERISIER NAIN à fruit rond précoce.* C'eſt celui qu'on plante en eſpalier au midi pour avancer encore la maturité de ſon fruit qu'il donne à la fin de Mai; mais ce fruit a la chair ſèche & l'eau ſure. Ceraſus pumila fructu rotundo, minimo acido præcociori.

*LA ROYALE HATIVE* ou *Mai-duke des Anglois.* C'eſt une variété de la Royale de Juillet, dont le fruit auſſi bon mûrit dès la fin de Mai; ce qui le rend bien préférable à notre ancien Cerifier-nain précoce. C. ſat. multifera fr. rot. magno rubro ſubnigricante, ſuaviſſimo.

*LE CERISIER-HATIF.* A proprement parler, ſon fruit n'eſt hâtif que quand on le cueille lorſqu'il eſt d'un rouge clair vers le commencement de Juin; alors ſon eau eſt aigre; mûr, ſa peau eſt d'un rouge foncé, ſon eau douce & agréable; mais il perd le mérite d'être précoce. Ceraſus ſativa fructu rotundo medio rubro, acido, præcociori.

*LE CERISIER DE HOLLANDE*, dit *Coulard.* La fleur de ce Cerifier eſt en effet très-ſujette à couler; la chair de ſon fruit eſt fine, ſon eau d'ailleurs eſt douce & très-agréable; le tems de ſa maturité eſt vers la mi-Juin. Ceraſus ſativa paucifera fructu rotundo magno, pulchre rubro, ſuaviſſimo.

*LE CERISIER A TROCHET*, ou *très-fertile.* La chair de cette Ceriſe eſt délicate, ſon eau aſſez agréable, s'il lui manque tant ſoit peu de douceur, la grande fècondité de l'arbre balance ce défaut. Ceraſus ſativa multifera, fructu rotundo medio, ſaturè rubro.

*LE CERISIER A BOUQUET.* Il paroît être une variété du précédent: on ſe plaît à voir les bouquets de trois ou quatre ceriſes & plus qu'il porte ſur une ſeule queue; mais elles ſont trop acides pour être mangées autrement qu'en compotte ou glacées de ſucre; elles mûriſſent après la mi-Juin. Ceraſus ſativa fructus rotundos acidos uno pediculo plures ferens.

*LE CERISIER commun à fruit rond.* Il y a un Ceraſus vul-

garis fructu rotundo. grand nombre de variétés de cette eſpèce ; la meilleure eſt celle qui ſe propage aux environs de Paris ; ce fruit eſt beau, ſa chair blanche, l'eau dont il abonde eſt un peu aigre, même dans ſa maturité : elle mûrit vers la fin de Juin.

Cet. vulgaris fructu rotuntundo, nucleo fragili. *Le Cerisier à noyaux tendres.* Cette Ceriſe eſt aſſez bonne pour une commune ; ſon noyau eſt proprement ligneux, mais fort mince & facile à rompre.

Ceraſus ſativa, fructu rotundo majore, dilutius rubro, gratiſſimi ſaporis vix aciduli. *Le Cerisier à gros fruit rouge pâle*, ou *Ceriſier de Vilennes.* Sa chair tranſparente eſt très-ſucculente, ſon eau eſt abondante, très-agréable, relevée d'un aigrelet à peine ſenſible. Cette Ceriſe qui mûrit à la fin de Juin eſt une des plus excellentes à manger crue : elle eſt préférable à toutes les autres pour confire, étant non-ſeulement groſſe, très-charnue & très-douce, mais d'une couleur claire qui rend les confitures très-délicates & agréables à la vue ; elle eſt encore aſſez rare aux environs de Paris.

C. ſat. multifera, fr. ſubcordato, magno, e rubro nigricante, ſuaviſſimo. *La Cerise-Guigne*, ainſi nommée, parce qu'elle tient en effet *de la Ceriſe & de la Guigne*, a l'eau douce d'un goût agréable, mais peu relevé, cette ceriſe mûrit à la fin de Juin : l'arbre en eſt très-abondant.

Ceraſus ſativa fructu rotundo maximo, e rubro nigricante, ſapidiſſimo. *Le Griottier de Portugal.* Cette Griotte mûrit dans le commencement de Juillet : elle eſt regardée comme la plus groſſe & la meilleure de toutes les Ceriſes ; ſa couleur eſt d'un rouge noir ; ſa chair ferme, ſon eau rouge, abondante, eſt ſans acide & relevée d'une petite amertume agréable : quelques-uns la nomment la *Griotte Royale*, *l'Archiduc*, *la Royale de Hollande*, *la Ceriſe de Portugal.*

Ceraſus ſativa multifera, fructu rotundo, magno, *Le Cerisier d'Angleterre. Chery-duke*, ou *Ceriſe Royale des Anglois.* Ce Ceriſier produit abondamment & devient fort à la mode : ſon fruit gros

eſt d'un rouge noir; ſa chair ferme, ſon eau très-douce ſans acide : il mûrit au commencement de Juillet. — e rubro ſubnigricante, ſuaviſſimo.

*Le Griottier.* La Griotte ordinaire eſt noire, très-douce & fort agréable : elle mûrit au commencement de Juillet. Il y en a une de moindre valeur, & qui eſt plus tardive. — Ceraſus ſativa fructu rotundo, magno, nigro, ſuaviſſimo.

*Le Cerisier de Montmorency ordinaire.* Sa chair eſt fine; ſon eau n'a d'acidité que pour la rendre agréable & en relever le goût : cette Ceriſe, moins groſſe que la ſuivante, mûrit au commencement de Juillet. — Ceraſus ſativa fructu rotundo, magno, rubro, gratè acidulo.

*Le Cerisier de Montmorency à gros fruit, le gros Gobet, le Gobet à courte-queue.* C'eſt ainſi qu'on nomme cette Ceriſe; elle a la chair fine; ſon eau eſt abondante & très-agréable; c'eſt la Ceriſe à confire qui n'eſt pas moins excellente à manger crue; elle mûrit vers la mi-Juillet. — Cer. ſativa fructu rotundo majore acutè & ſplendidè rubro, brevi pediculo.

*Le Cerisier à fruit ambré*, dit *à fruit blanc.* Ce fruit très-peu commun eſt excellent; il abonde d'une eau ſucrée & fort douce ſans fadeur; il mûrit vers la mi-Juillet. Il y en a une autre plus ambrée, mais fort inférieure en bonté. — Ceraſus ſativa fructu rotundo magno, partim rubello, partim ſuccineo colore.

*Le Griottier d'Allemagne*, connu ſous les noms de *groſſe Ceriſe de M. le Comte de Sainte-Maure*, ou *Griotte de Chaux.* Sa chair rouge eſt abondante en eau, peut-être un peu trop relevée d'acide; elle mûrit à la mi-Juillet : l'arbre eſt petit & délicat. — Ceraſus ſativa fructu ſubrotundo, mâgno, e rubro nigricante, acido.

*Le Cerisier à petit fruit noir.* C'eſt la *groſſe Ceriſe à ratafia* qui mûrit en Août; elle eſt peu propre à manger crue; mais ſa couleur, ſa petite amertume & même ſon âcreté la rendent très-bonne pour les ratafia & le vin de Ceriſe. — Ceraſus vulgaris fructu rotundo, parvo, atro-rubente, ſubacri & ſubamaro, ſerotino.

Cer. vul. fr. rotundo, minimo atro rubente, acri & amaro, ſerotino.

*Cerisier à très-petit fruit noir.* C'eſt la *petite Ceriſe à ratafia.* Variété de la précédente, moins groſſe, plus âcre & plus amère, ce qui la lui fait préférer encore.

Ceraſus ſativa æſtate continuâ florens ac frugeſcens.

*Le Cerisier de la Touſſaint* ou *de la Saint-Martin*, ou *Ceriſier tardif.* Cet arbre plus curieux qu'utile, rapporte des fruits fort acides, dont il eſt vrai que les derniers ne mûriſſent qu'en novembre, lorſqu'il eſt en eſpalier au nord, ce qui vient de ce que ſes branches à fruit ne ceſſent pendant tout l'été de faire de nouvelles productions; en ſorte qu'on y voit en même tems des boutons de fleurs, des fleurs épanouies, des fruits qui nouent, d'autres verts, d'autres qui commencent à rougir, & d'autres qui ſont mûrs.

Ceraſus vulgatis duplici flore.

*Le Cerisier à fleur ſemi-double.* Il ne mérite d'être cultivé que pour ſa fleur; ſon fruit qui noue rarement eſt de moyenne groſſeur, d'un rouge clair, peu charnu & fort acide.

Ceraſus vulgaris flore pleno ſterili.

*Le Cerisier à fleur double.* Quoiqu'il ne rende point du tout de fruit, ſa fleur plus double le rend préférable au précédent.

## LES PRUNIERS.

Prunus fructu parvo, longo, cereo, præcoci.

*La Prune jaune hâtive*, ou *Prune de Catalogne.* Elle eſt petite; ſa chair eſt molaſſe & un peu groſſiere, mais ſon eau eſt ſucrée, quelquefois un peu muſquée; on fait de bonnes compotes de ce fruit: expoſé en eſpalier, il mûrit au commencement de Juillet, & en plein vent vers le milieu de ce mois.

Prunus fructu parvo, ova-

*La Précoce de Tours.* Celle-ci eſt noire, pareillement ovale; ſon eau eſt agréable & aſſez abon-

dante, ayant un peu de parfum ; cette Prune mûrit avant la mi-Juillet.

to, nigro, præcoci.

*Le Monsieur hatif.* C'eſt une variété du Monſieur de la fin de Juillet, dont il diffère peu, ſinon par ſa maturité ; celui-ci précédant l'autre de quinze jours ; il eſt moins rond & d'une couleur plus foncée.

Prunus fructu magno ſubrotundo, ſaturè violaceo, præcoci.

*La Grosse noire hative*, dite *Noire de Montreuil.* On confond quelquefois à tort cette Prune avec le gros Damas de Tours. Sa chair eſt ferme, aſſez fine ; ſon eau eſt agréable, relevée de parfum ; elle eſt plutôt violette que noire : le tems de ſa maturité eſt à la mi-Juillet.

Prunus fructu medio, longo, pulchrè violaceo, præcoci.

*Le gros Damas de Tours.* Ce fruit eſt de moyenne groſſeur, de forme allongée, de couleur violette foncée ; ſa chair eſt ferme & fine, ſon eau ſucrée tient du parfum des bons Damas ; la peau eſt adhérente à la chair, & y donne un peu d'aigreur ; le noyau y tient auſſi ; cette Prune mûrit au tems de la précédente.

Prunus fructu medio, longulo, ſaturè violaceo.

*La Prune de Monsieur.* L'arbre produit beaucoup de fruit dont la chair eſt fine & fondante, ayant acquis ſa parfaite maturité ; ſi le Prunier n'eſt pas dans une terre chaude & légere, l'eau en eſt un peu fade : cette Prune groſſe, ronde & d'un beau violet, mûrit à la fin de Juillet.

Prunus fructu magno, globoſo, pulchrè violaceo

*La Royale de Tours.* Elle eſt groſſe, applatie, en partie rouge & en partie violette ; ſa chair eſt fine & très-bonne, ſon eau abondante, ſucrée & relevée ; ce fruit eſt excellent, quand on ne lui laiſſe pas acquérir ſur l'arbre ſa parfaite maturité.

Prunus fructu magno, ſubrotundo, compreſſo, hinc violaceo, indè rubello.

*La Diaprée violette.* Cet arbre eſt fertile, la chair de ſon fruit eſt ferme & délicate, ſon eau eſt ſucrée & agréable : cette Prune mûrit au commence-

Prunus fructu medio, longiori violaceo.

ment d'Août ; elle eſt très-charnue & fort bonne, de forme allongée & de moyenne groſſeur.

Prunus fructu medio, ovato, hinc ſature, inde pallide tubro.

*Le Damas rouge.* Il eſt aſſez gros, de forme ovale ; ſa couleur eſt rouge foncé en deſſus & rouge pâle en-deſſous ; ſa chair fine eſt fondante, point molaſſe ; ſon eau eſt ſucrée, ſon noyau quitte la chair ; mais ce fruit qui mûrit à la mi-Août, eſt un peu ſujet à être vereux, & l'arbre en rapporte peu.

Prunus fructu parvo, undique compreſſo, ſaturatiùs violaceo.

*Le Damas musqué.* Sa chair eſt ferme ; ſon eau abondante eſt d'un goût relevé & muſqué ; ſon noyau quitte la chair. Cette Prune nommée encore *Prune de Chypre* ou *de Malthe*, mûrit au tems de la précédente : elle eſt petite, comprimée de tous côtés, & d'un violet foncé.

Prunus fructu magno, ſubrotundo-compreſſo, dilute violaceo.

*La Prune Royale.* Elle eſt groſſe, de forme ronde, applatie : ſa peau eſt colorée d'un violet gai, & ſa chair d'un vert clair & tranſparent, elle eſt ferme & fine, ſon eau a un goût très-relevé tenant de celui des Perdrigons, le noyau ne tient point à la chair ; dans ſa maturité elle ſuit la précédente.

Prunus fructu parvo (vel minimo) rotundo oblongo, ſuccineo colore.

*La Mirabelle.* Cet arbre donne beaucoup de fruit par bouquet, dont la chair eſt ferme & un peu ſeche, ſi elle n'eſt bien mûre ; ſon eau eſt ſucrée, ſon noyau qui eſt tendre ne tient point à la chair : cette Prune mûrit vers la mi-Août ; elle eſt aſſez bonne crûe, mais ſur-tout, quoique très-petite, fort eſtimée pour les confitures & les compotes, prenant un parfum délicieux dans le ſucre ; on en fait auſſi de jolis pruneaux ; la petite Mirabelle eſt un peu plus jaune, plus hâtive, mais plus ſéche.

Prunus fructu parvo, rotundo, flavo, maculis rubris conſperſo.

*Le Drap d'or*, ou *la Mirabelle double.* Sa chair eſt fondante & très-délicate, ſon eau eſt fort ſucrée & d'un goût très-fin ; ſon noyau quitte la chair : cette Prune tranſparente mûrit vers la mi-Août ; elle

eſt mouchetée de taches rouges & plus ronde que la Mirabelle.

*L'Impériale violette.* Elle eſt ovale & groſſe, ſa chair ferme, un peu ſéche & tranſparente, ſon eau eſt ſucrée & relevée, ſon noyau pointu n'eſt point adhérent à la chair; cette Prune mûrit vers le vingt d'Août. Prunus fructu magno, ovato, dilute violaceo.

*Le Damas violet.* Ce fruit, au nombre des bons, mûrit à la fin d'Août; ſa chair eſt ferme, ſon eau ſucrée ayant un peu d'aigre; le noyau tient à la chair par un point ſur le côté. Prunus fructu medio, longo, violaceo.

*Le Damas-Dronet.* Cette petite Prune eſt allongée, d'un vert blond; ſa chair eſt tranſparente, ferme & fine, ſon eau ſucrée, d'un goût agréable; elle eſt excellente & mûrit à la fin d'Août. Prunus fructu parvo, longo, e viridi flaveſcente.

*Le Damas d'Italie.* L'arbre eſt fertile; l'eau de ſon fruit eſt ſucrée & de fort bon goût, ſon noyau tient peu à la chair; c'eſt une très-bonne prune, de moyenne groſſeur, de forme preſque ronde & colorée d'un beau violet; elle mûrit à la fin d'Août. Prunus fructu medio, prope rotundo, dilute violaceo.

*Le Damas de Maugerou.* Cet arbre donne beaucoup de fruits preſque ronds & gros, dont la chair & ferme, l'eau ſucré & agréable; le noyau quitte la chair, cette Prune eſt excellente, mais un peu ſujette aux vers; ſa couleur eſt un beau violet moucheté de points roux; elle mûrit au tems de la précédente. Prunus fructu magno prope rotundo, dilute violaceo, punctis fulvis diſtincto.

*Le Damas noir tardif.* L'eau de ce fruit eſt abondante & agréable, quoiqu'elle ait un peu d'aigreur; ſon noyau ne tient point à la chair: cette prune mûrit à la fin d'Août; elle eſt longuette. Prunus fructu parvo, longulo, nigricante.

*Le Perdrigon violet.* Il faut mettre cet arbre Prunus fructu medio lon-

gulo, e pulchre violaceo rubescente punctis flavis distincto.

en espalier, parce qu'il noue difficilement en plein vent; son fruit de forme allongée, a la peau d'un violet rougeâtre, piquetée de points jaunes; sa chair est fine & délicate, son eau fort sucrée, d'un goût très-relevé & d'un parfum qui lui est propre; son noyau est adhérent à la chair; c'est en quoi il diffère le plus du précédent & par sa couleur.

Prunus fructu medio, oblongo, hinc sature, inde dilute violaceo, punctis fulvis conspersо.

*Le Perdrigon normand.* Ce Prunier est vigoureux; mais ses fleurs sont un peu sujettes à couler; ses fruits sont de moyenne grosseur, de forme un peu allongée & colorés d'un violet charmant d'un côté & d'un violet brun de l'autre; toute leur surface est mouchetée de taches jaunes: ils ont la chair ferme, fine & délicate, sont abondants en eau douce & relevée: ces Prunes sont au rang des bons fruits.

Prunus fructu magno, paululùm compresso, viridi, notis cinereis & rubris conspersо.

*La Dauphine*, ou *grosse Reine-Claude*, nommée aussi *Verte-bonne* & *Abricot vert.* L'arbre est fertile & vigoureux; on sait que la Reine-Claude est grosse, ronde, un peu applatie, verte dehors & dedans, marquée de taches cendrées & de taches rouges; la chair de ce fruit est très-fine, délicate & fondante, sans être mollasse; son eau est abondante, sucrée & d'un goût excellent; son noyau tient à la chair par l'arrête & par un petit endroit sur chaque côté de son plat: cette Prune mûrit au tems des dernieres précédentes; elle passe à bon droit pour la meilleure des Prunes, pour être mangée crue; on en fait de bonnes compotes & de belles confitures.

Prunus fructu magno, longiori, dilute violaceo.

*La Prune jacinte.* Le fruit de cet arbre plein de vigueur est d'un violet clair, de forme allongée; sa chair est ferme sans être sèche, son eau est assez relevée & un peu aigrelette; le noyau tient à la chair par quelques endroits sur le côté.

Prunus fructu quàm ma-

*L'Impériale blanche.* Ce Prunier produit peu de fruit & qui n'a pour partage que la beauté; la

prune eſt preſque de la groſſeur & de la forme d'un œuf de Dinde, & ſeulement propre à faire des compotes, avec beaucoup de ſucre, ſon eau étant aigre & déſagréable. ximo, ovato, albo.

*La petite Reine-Claude.* Elle mûrit au commencement de Septembre, & quoiqu'inférieure à la Dauphine, elle eſt au rang des bonnes Prunes; ſon arbre donne auſſi beaucoup de fruit, qui n'eſt pas auſſi gros, & de couleur plus pâle, dont l'eau eſt ſucrée, mais moins relevée que celle de la Dauphine ou belle Reine-Claude; ſa chair eſt ferme & un peu ſéche, ſouvent aſſez fondante, mais un peu groſſiere, & quelquefois un peu pâteuſe. Prunus fructu medio, totudo-compreſſo, e viridi albido.

*Le Prunier à fleur ſemi-double.* Cet arbre eſt une varieté de la Dauphine; il produit moins de fruit, il mérite plus d'être cultivé pour ſa fleur que pour ſon fruit qui eſt de moyenne groſſeur & dont la chair eſt plus groſſière que celle de la petite Reine-Claude; ſon eau devient très-fade dans ſon extrême maturité. Son noyau tient à la chair. Prunus flore ſemi-duplici.

*Le petit Damas blanc.* Ce blanc n'eſt qu'un jaune verdâtre; ſa forme eſt aſſez ronde, la chair de ce fruit eſt ſucculente, ſon eau eſt aſſez abondante & agréable, quoiqu'ayant un petit goût de Sauvageon; ſon noyau n'eſt point adhérent à la chair. Prunus fructu parvo, ſubrotundo, e viridi cereo.

*Le gros Damas blanc.* La chair de ce fruit tient de celle du petit Damas; ſon eau eſt plus douce & meilleure, ſa forme eſt allongée. Prunus fructu medio, oblongo, e viridi cereo.

*Le Perdrigon blanc.* Ce Prunier, ſujet à couler, convient en eſpalier; la chair de ſon fruit eſt tranſparente, fine & fondante quoique ferme; ſon eau a un parfum qui lui eſt propre; elle eſt ſi ſucrée que le fruit étant mûr paroît au goût comme confit, ſon noyau quitte la chair; le Perdrigon blanc eſt Prunus fructu parvo, ovoïdali, e viridi albido, maculis rubris ad ſolem diſtincto.

petit & ovoïde, ſa couleur eſt un blanc-verdâtre dans lequel le ſoleil découvre des taches rougeâtres. De cette excellente Prune bonne crue & confite, on fait des pruneaux ſéchés au ſoleil qu'on nomme Brugnoles; les meilleurs venants d'un village de Provence ainſi nommé : elle mûrit comme les précédentes au commencement de Septembre.

Prunus fructu magno, rotundo compreſſo, hinc e viridi albido, inde non nihil rubente.

*La Prune abricotée.* Sa chair ferme eſt abondante en eau quand le fruit eſt bien mûr, elle eſt ſucrée & muſquée, ſon noyau ne tient point à la chair; cette Prune, qui eſt fort bonne, eſt de forme ronde, applatie, de couleur vert-pâle avec un ſoupçon de rouge.

*La Prune-Abricot* eſt plus rouge que celle-ci, ſa peau eſt plus jaune tiquetée de rouge, ſa chair eſt auſſi plus jaune & plus ſéche.

Prunus fructu parvo, ovato longo, e viridi albido.

*La Diaprée blanche.* Elle eſt plus petite que la rouge, de forme ovale, allongée, de couleur verte pâle, ſon eau très-ſucrée & d'un goût relevé très-fin, ſur-tout ſi l'arbre eſt en eſpaliet.

Prunus fructu medio, longiori cerafi colore, punctis fuſcato.

*La Diaprée rouge*, ou *Roche-Corbon.* Cette Prune de moyenne groſſeur & allongée eſt en effet couleur de Ceriſe diaprée de rouſſâtre; elle a la chair ferme & fine, ſon eau eſt abondante, d'un goût relevé & très-ſucré; ſon noyau quitte la chair.

Prunus fructu medio, oblongo compreſſo, luteolo.

*L'Impératrice blanche.* La chair de cette Prune eſt ferme, ſon eau eſt ſucrée & agréable; ſon noyau quitte bien la chair; elle eſt charnue & bonne, jaunette, de moyenne groſſeur & applatie ſur ſa longueur.

Prunus fructu quàm maximo, ovato, luteo.

*La Dame-Aubert*, ou *Groſſe luiſante.* Elle n'eſt propre qu'en compotes en prévenant ſon extrême maturité; ce fruit eſt jaune, ovale & prodigieuſement gros.

*L'Ile verte*, ou *Ilevert*. Sa chair eſt groſſiere & molaſſe, ſon eau eſt aigre, cependant ſucrée, mais ayant un goût de ſauvageon qui n'eſt pas agréable; cette Prune qui eſt groſſe & très-allongée, n'eſt bonne qu'en compottes & en confitures.

Prunus fructu magno, longiſſimo viridi.

*Le Perdrigon rouge*. L'arbre eſt fertile, le fruit eſt petit, ovoïde, d'un beau rouge, couvert de points jaunes; ſa chair eſt fine & ferme, ſon eau abondante, ſucrée & relevée; ce fruit eſt excellent, ſon noyau ſe détache aiſément.

Prunus fructu parvo, ovoidali, pulchre rubro, punctis fulvis conſperſo.

*La Sainte-Catherine*. Elle eſt de forme longue & de couleur de cire, délicate étant bien mûre; ſon eau eſt ſucrée, fort agréable; ſon noyau ne tient nullement à la chair; cette Prune eſt excellente & mûrit à la mi-Septembre.

Prunus fructu medio, oblongo, cereo.

*La Prune de Chipre*. Sa chair eſt ferme, ſon eau eſt aſſez abondante & ſucrée, elle a un peu d'aigreur & un goût de ſauvageon; ce fruit eſt néanmoins bon dans ſon extrême maturité; ſon noyau tient peu à la chair; cette Prune ronde eſt fort groſſe & d'un violet clair.

Prunus fructu maximo, rotundo, dilute violaceo.

*La Prune Suisse*. L'arbre eſt fertile, la chair de ſon fruit eſt peu ferme, ſon eau eſt abondante, très-ſucrée, d'un goût relevé & agréable; ſon noyau eſt adhérent par quelques endroits: cette Prune dure tout le mois de Septembre; elle eſt de groſſeur médiocre, bien ronde & d'un beau violet.

Prunus fructu medio, globoſo, pulchre violaceo, ſerotino.

*La Bricette*. Cette petite Prune ſe termine en pointe aux deux extrêmités, ayant le côté de la tête plus allongé que celui de la queue; ſa peau eſt d'un vert jaunâtre, ſa chair ferme, ſon eau aſſez abondante, un peu aigrelette; ſon noyau ne tient point à la chair: cette Prune dure longtems, car dans certaines années les premieres mûriſſent au commen-

Prunus fructu parvo, longioti, utrinque acuto, e viridi luteo.

cement de Septembre, & les dernieres à la fin d'Octobre.

Prunus fructu parvo, oblongo, fature violaceo, ſerotino.

*Le Damas de septembre*, ou *Prune de Vacance*. Ce prunier manque peu de donner du fruit, il eſt petit, allongé & d'un violet foncé; la chair en eſt caſſante, aqueuſe dans les automnes chauds; ſon eau eſt d'un goût relevé, agréable ſans aigreur : le noyau de cette Prune quitte la chair, elle mûrit à la fin de Septembre.

Prunus fructu medio, longiori, utrinque acuto, pulchre violaceo, ſerotino.

*L'Impératrice violette*. Sa chair eſt ferme & délicate, ſon eau eſt douce, peu relevée. Cette Prune mûrit en Octobre; elle eſt de groſſeur médiocre & pointue par les deux bouts.

## LES ABRICOTIERS.

Armeniaca fructu parvo, rotundo, partim rubro, partim flavo præcoci.

*L'Abricot précoce*, ou *Abricot hâtif muſqué*. La chair de cet Abricot quitte le noyau, ſon eau eſt abondante; on croit y trouver un petit goût de muſc; ſa peau jaune ſe colore d'un peu de rouge : il mûrit au commencement de Juillet.

Armeniaca fructu parvo, rotundo, albido, præcoci.

*L'Abricot blanc*, dit *Abricot-Pêche*. Ce fruit, qui mûrit à-peu-près au tems du précédent, a la chair fine & délicate, adhérente au noyau; ſon eau eſt abondante, douce, peu relevée, ayant un petit goût de Pêche.

Armeniaca vulgaris fructu majori.

*L'Abricot commun*. La chair de ce fruit eſt un peu pâteuſe, & ſon eau peu relevée : il mûrit vers la mi-Juillet.

Armeniaca fructu parvo, oblongo nucleo dulci.

*L'Abricot angoumois*. Il eſt petit, de forme allongée; ſa chair eſt rougeâtre, aſſez fondante; ſon eau eſt vineuſe, d'un goût relevé & fort agréable;

ſon noyau quitte la chair, l'amande eſt agréable à manger, on y trouve un petit goût d'aveline nouvelle : il mûrit vers la mi-Juillet.

*L'Abricot de Hollande*, nommé auſſi *Amande-Aveline*. Cet Abricot, qui eſt un des meilleurs, mûrit vers la fin de Juillet, ſa chair eſt fine, ſon eau eſt d'un goût relevé & excellente, ſon amande douce a un goût d'Aveline & un arrière-goût d'Amande douce très-agréable.

Armeniaca fructu parvo, rotundo nucleo dulci amygdalinum ſimul & avellaneum ſaporem referente.

*L'Abricot de Provence*. Ce fruit eſt petit & de forme applatie, on y trouve une eau vineuſe d'un goût fin & relevé, ſon noyau contient une amande douce : il mûrit à la mi-Juillet.

Armeniaca fructu parvo, compreſſo, nucleo dulci.

*L'Abricot de Portugal*. Sa chair eſt fine & délicate, un peu adhérente au noyau ; ſon eau eſt abondante, d'un goût relevé ; ce fruit, qui paſſe pour un des meilleurs, mûrit vers la mi-Août ; il eſt jaune & bien coloré de rouge.

Armeniaca fructu parvo, rotundo, hinc flavo, inde rubeſcente.

*L'Abricot violet*. Il n'a qu'en partie cette couleur ; le deſſous du fruit eſt d'un jaune rougeâtre ; mais ſa chair imite celle du melon à chair rouge ; ſon eau ſucrée & aſſez relevée n'eſt point abondante ; ſon noyau adhérent à la chair contient une amande fort douce : ce fruit, toutes fois plus curieux que bon, mûrit au commencement d'Août. L'Abricot noir paroît en être une variété.

Armeniaca fructu parvo, compreſſo, hinc violaceo, inde flavo rubeſcente, nucleo dulci.

*L'Abricot-Alberge*. Cet Abricot eſt applati, d'un jaune rouſſâtre d'un côté & verdâtre de l'autre ; ſa chair, qui eſt teinte de rouge, eſt tendre, preſque fondante, d'un goût vineux, relevé, mêlé d'un peu d'amertume qui n'eſt pas déſagréable : ſa maturité eſt à la mi-Août.

Armeniaca fructu parvo, compreſſo, e flavo hinc non nihil rubeſcente, inde vireſcente.

*L'Abricot de Nanci*. La chair de ce fruit très-

Armeniaca

fructu maximo, compresso, hinc flavo, inde rubescente.

fondante ne devient ni sèche, ni pâteuse dans son extrême mâturité; son eau est abondante, d'un goût relevé, très-agréable & particulier à cet abricot : cet excellent & beau fruit mûrit à la mi-Août; il est nommé par quelques-uns *Abricot-Pêche*. Il est très gros, un peu plat, d'un jaune foncé & rougit du côté du soleil.

## LES NEFLIERS.

Mespilus germanica folio laurino non serrato.

*Le Neflier des bois* ne se transplante dans les jardins que pour recevoir les greffes de Poiriers & d'autres arbres de sa famille. Son fruit est cependant meilleur que la grosse Nèffle.

Mespilus folio laurino, fructu sine ossiculis.

*Le Neflier sans noyau*. Ses fruits que la culture rend un peu plus gros que les Nèfles des bois, sont préférables à tous ceux de cette espèce, étant délicats, prompts à mollir entiérement & sans noyaux.

Mespilus folio laurino major.

*Le Neflier cultivé a gros fruit noir* est beaucoup plus grand que les deux précédens. Si son fruit a l'avantage de la grosseur, il n'a pas celui de la bonté; l'art est nécessaire pour le faire mollir.

## LES POIRIERS.

Pyrus fructu parvo, pyriformi, glabro, citrino, præcoci.

*L'Amirée Joannet*. Sa chair est tendre, son eau abondante est un peu relevée; cette Poire mûrit à la fin de Juin; elle est petite, bien faite, lisse & de couleur citrine.

Pyrus fructu minimo, præcoci.

*Le petit Muscat*, dit *Sept-en-gueule*. L'arbre se plaît en plein vent dans un terrein sec; ce petit fruit mûrit au commencement de Juillet; il est estimé à cause de sa primeur; sa chair demi-beurrée n'est

pas bien fine, ſon eau eſt d'un goût relevé & muſqué fort agréable.

*L'Aurate.* Cette Poire petite & faite en courge eſt d'un beau jaune, teint de rouge en partie; ſa chair demi-beurrée eſt un peu ſèche; ſon pepin eſt au milieu de quelques pierres; ſon eau eſt un peu relevée : elle mûrit en Juillet.

Pyrus fructu parvo, cucurbitato, hinc luteo, inde dilute rubro, æſtivo.

*Le Muscat Robert*, autrement *Poire à la Reine*, ou *Poire d'ambre.* Sa peau eſt liſſe, d'un vert blond : ſa chair eſt tendre, fine, fondante, preſque ſans marc, abondante en eau ſucrée & d'un goût bien relevé : cette Poire mûrit à la mi-Juillet.

Pyrus fructu medio, pyriformi, glabro, e viridi flaveſcente æſtivo.

*Le Muscat fleuri.* Cette Poire eſt fort petite, plus platte que ronde; ſa peau eſt liſſe, d'un vert blond & qui prend du rouge au ſoleil; ſa chair demi-beurrée laiſſe du marc dans la bouche; ſon eau peu relevée eſt un peu muſquée : elle mûrit après la mi-Juillet.

Pyrus fructu minimo, globoſo, compreſſo, glabro, partim e viridi luteſcente, partim rubeſcente, æſtivo.

*La Madelaine*, dite *Citron des Carmes.* Elle eſt aſſez groſſe & d'un vert jaune ou citron; ſa chair eſt fine, fondante & ſans pierres; elle abonde en eau douce d'un aigrelet fin & d'un parfum qui la rend agréable : elle mûrit au mois de Juillet, & mollit en peu de tems.

Pyrus fructu medio, turbinato, e viridi æſtivo.

*La Poire de Hastivau.* La chair de cette Poire eſt demi-beurrée, laiſſe du marc dans la bouche; ce fruit mûrit vers la mi-Juillet : il eſt joli, mais pas excellent; très-petit, en toupie applatie, liſſe & de couleur jaune.

Pyrus fructu minimo, turbinato, compreſſo, glabro, luteo, æſtivo.

*Le Rousselet hatif*, ou *la Poire de Chypre.* Il ſe trouve ſouvent du ſable autour des pepins; ſa chair eſt demi-caſſante; ſon eau eſt très-parfumée & ſucrée; ſon rouge n'eſt pas des plus foncés, & ſon vert eſt fort blond,

Pyrus fructu parvo, pyriformi, hinc intenterubro, inde flavo, æſtivo.

Pyrus fructu medio, longiſſimo, ſplendente partim e viridi flaveſcente, partim ſub-obſcure rubro, æſtivo.

*La Cuisse-Madame.* Elle abonde en eau ſucrée & un peu muſquée, ſa chair eſt demi-beurée : cette Poire mûrit à la fin de Juillet : elle eſt de médiocre groſſeur, extraordinairement alongée, & ſa peau luſtrée eſt en partie d'un vert blond, en partie d'un rouge brun.

P. fr. parvo, pyriformi, glabro, partim ex albido flaveſcente, partim dilutiùs rubro, æſtivo.

*Le gros Blanquet*, ou *la Blanquette* eſt cependant encore petite, mais bien faite; elle a la peau mi-partie d'un blanc blond & d'un beau rouge, la chair caſſante, l'eau ſucrée & relevée; elle mûrit à la fin de Juillet.

P. f. parvo, turbinato, glabro, partim ex albido flaveſcente, partim dilute rubro æſtivo.

*Le gros Blanquet rond.* Cette Poire n'eſt pas plus groſſe que l'autre, ſa forme eſt plus en toupie; elle a les mêmes couleurs, ſa chair eſt aſſez délicate; ſon eau a un parfum agréable.

Pyrus fructu medio, longiſſimo ſubviridi, maculis fulvis diſtincto, æſtivo.

*L'Epargne*, ou *Beau préſent*, ou *Poire de Saint-Samſon.* La chair de cette Poire eſt fondante, ſon eau eſt relevée, d'un aigrelet fin très-agréable; elle mûrit au commencement d'Août : ſa groſſeur eſt médiocre, ſa forme très-alongée, ſa couleur d'un vert pâle, tachetée de marques rouſſâtres.

*L'Ognonet*, *Archiduc d'Eté*, ou *Amiré roux.*

Pyrus fructu medio, turbinato, lucido, partim flavo, partim intente rubro, æſtivo.

Cette Poire, comme ſon nom le porte, eſt plus applatie qu'une Pomme : elle a la peau luiſante, jaune & rouge, ſa chair eſt demi-caſſante, quelquefois pierreuſe; ſon eau eſt relevée d'un goût roſat : elle mûrit en Juillet & Août.

Pyrus fructu parvo, pyriformi, ſubflaveſcente, æſtivo.

*La Poire de Sapin* eſt petite, bien faite & aſſez blonde; ſa chair eſt un peu groſſière; ſon eau eſt aſſez relevée & parfumée.

P. fructu medio, umbilico compreſſo, & quaſi gemino, æſtivo.

*La Poire a deux tetes* eſt de moyenne groſſeur & ronde; ſon ombilic ſerré qui ſemble être double, lui a fait donner ce nom; elle eſt commune, mais peu délicate; ſon eau eſt abondante & un peu parfumée.

La

*La Belissime d'Eté*, ou *Suprême.* Cette Poire petite, mais bien faite, eſt d'un côté d'un brun rouge foncé, citrine de l'autre, rayée de lanieres rougeâtres; ſa chair eſt demi-beurrée; le point de ſa maturité paſſé, elle ne tarde pas à mollir, ou à devenir cotonneuſe: quoique ſon eau ſoit peu relevée, elle eſt douce & fort agréable.

P. fr. parvo, ferè pyriformi, hinc pulchrè & saturè rubro, indè citrino, tæniolis rubellis virgato, æstivo.

*Le Bourdon musqué* eſt petit; il a la forme d'une orange, & ſa couleur eſt un vert gai; ſa chair eſt blanche, groſſière & caſſante; elle eſt abondante en eau ſucrée & muſquée.

Pyrus fructu parvo, aurantii formâ, subrotundo, dilutè viridi, æstivo.

*Le Blanquet à longue queue.* Sa chair eſt demi-caſſante, blanche & fine; ſon eau abondante, ſucrée, relevée d'un parfum agréable. Cette Poire liſſe & blanche eſt petite & fort alongée du côté de la queue.

P. fr. parvo, pyriformi acuto, glabro, albido, æstivo.

*Le petit Blanquet*, ou *Poire à la Perle.* Elle en a la forme, la couleur, & eſt extrêmement petite; ſa chair eſt blanche, fine, demi-caſſante, ſon eau fort agréable.

P. f. minimo, Elenchi formâ, glabro, ex albido flavescente, æstivo.

*Le gros Hastivau de la Forêt.* C'eſt une petite Poire qui a la chair ferme, même un peu ſèche; elle mûrit vers la mi-Août; ſa peau eſt de trois couleurs, vert blond, rouge vif & rouge foncé.

P. f. parvo, turbinato, glabro, hinc e viridi subflavescente, inde saturè & splendidè rubro, æstivo.

*La Poire d'Ange.* Elle eſt petite, formée en toupie, elle a la peau jaunâtre, la chair fine, demi-caſſante; ſon eau eſt bien muſquée.

P. fr. parvo turbinato, e viridi subflavescente, æstivo.

*La Poire sans peau*, ou *Fleur de Guignes.* Sa chair eſt fondante & aqueuſe; ſon eau très-bonne, douce & parfumée. Elle eſt de moyenne groſſeur, bien faite, un peu alongée, de deux couleurs vert pâle & blond, marquée de taches ſanguines peu ſenſibles.

P. f. medio, pyriformi longo, partim pallidè viridi, partim flavo, maculis sanguineis evanidis conspersо, æstivo.

P. f. parvo, fere pyriformi obtuſo, hinc citrino, inde ſature rubro, æſtivo.

*Le Parfum d'Aoust.* Sa couleur eſt un jaune citron coloré en partie d'un rouge foncé; ſa chair eſt un peu groſſiere; mais ſon eau eſt abondante & bien muſquée.

P. f. medio, pyriformi, melino, inde dilutiùs rubente, æſtivo.

*La Chair a Dame*, ſuivant d'autres, *Chere Adame.* Cette Poire bien faite & de moyenne groſſeur eſt en deſſus d'un rouge clair, & d'un jaune rouge en deſſous; ſa chair eſt demi-caſſante, aſſez fine, ſon eau douce, relevée d'un petit parfum agréable.

P. fr. medio, turbinato-truncato, glabro part. e viridi flaveſcente, part. intenſe & ſplendide rubro, æſtivo.

*Le Fin or d'Eté.* Elle eſt médiocre, faite en toupie tronquée; ſa peau liſſe eſt d'un vert blond en deſſous, & par deſſus d'un rouge foncé, mais brillant; ſa chair eſt fine, demi-beurrée; ſon eau n'eſt pas déſagréable.

P. f. magno, ſubrotundo, compreſſo, partim e viridi flaveſcente, partim dilute roſeo, æſtivo.

*L'Epine-Roſe*, ou *Poire de Roſe.* Sa chair eſt tendre & demi-fondante, ſon eau muſquée & ſucrée; elle eſt groſſe, ronde, un peu applatie, d'un vert blond & teinte de roſe.

P. fr. medio, rotundo, cerino, maculis rufis diſtincto, æſtivo.

*Le Salviati.* Cette Poire eſt moyenne, ronde, d'un jaune de cire tacheté de roux; ſa chair excellente eſt demi-beurrée & ſans marc; ſon eau eſt ſucrée & d'un parfum agréable.

P. fr. medio, aurantii formâ, paululùm compreſſo, papulato, viridi, æſtivo.

*La Poire d'Orange musquée.* C'eſt par ſa forme & ſa peau grainue qu'elle tient de l'Orange; ſa couleur eſt verte, ſa chair eſt caſſante; elle devient cottonneuſe, ſi elle n'eſt cueillie un peu verte; ſon eau eſt relevée d'un muſc fort agréable : cette Poire mûrit en Août.

P. f. medio, aurantii formâ, partim cinereo, partim inſigni rutilo, æſtivo.

*La Poire d'Orange rouge.* Ce rouge eſt une couleur rouſſe très-vive, mais entrecoupée de cendré. Sa chair demi-caſſante ſe cotonne aiſément. Son eau eſt ſucrée & un peu parfumée de muſc.

*La Robine*, ou *Royale d'Eté.* Sa chair eſt un peu ſèche & demi-caſſante; ſon eau eſt très-muſquée & ſucrée; cette Poire eſt petite, en forme de toupie applatie, d'un vert blanchâtre.

P. f. parvo, turbinato-compreſſo, e viridi ſubalbido, æſtivo.

*La Sanguinole.* Cette Poire, bien faite & de moyenne groſſeur, a la peau liſſe & la chair rouge; elle eſt plus curieuſe que bonne: elle mûrit à la fin d'Août.

Pyr. fr. medio, pyriformi glabro, carne rubente, æſtivo.

*Le Bon-Chrétien d'Eté' musqué.* Il eſt moins gros que le Gracioli, de la forme d'un Coin dont il prend auſſi les couleurs; ſa chair eſt caſſante, ſon eau ſucrée, beaucoup relevée & muſquée; cette Poire mûrit au commencement de Septembre; c'eſt un beau & bon fruit, mais qui ſe crevaſſe quelquefois avant ſa maturité.

P. f. medio, pyramidato, mali cydonii formâ e flavo non nihil rubente, æſtivo.

*Le Roy d'Eté*, ou *Gros Rouſſelet.* Sa peau eſt rude; le vert en eſt épais; ſa chair demi-caſſante eſt peu fine, ſon eau eſt bonne, parfumée & un peu aigrelette.

P. f. medio, pyriformi acuto, ſcabro, hinc ſpiſſius virente, indè obſcure rubente, æſtivo.

*La Poire d'Œuf.* Elle a la forme d'un œuf, & eſt à-peu-près de même groſſeur; ſa chair eſt fine, tendre & aſſez fondante; ſon eau eſt ſucrée, douce & agréable au goût.

P. fr. parvo, ovi formâ, æſtivo.

*La Cassolette*, ou *le Friolet*, *Muſcat vert*, & *Lechefrion.* La chair de cette Poire eſt fine & caſſante, ſon eau ſucrée & muſquée; elle eſt petite, bien faite, en partie d'un vert blond, & en partie d'un beau rouge.

P. f. parvo, pyriformi, partim e viridi ſubflaveſcente, partim dilute rubente, æſtivo.

*La Grise-bonne.* Cette Poire médiocre eſt formée en courge; mais alongée, d'un vert cendré, moucheté de points blanchâtres: ſa chair eſt fondante, un peu beurrée.

P. f. medio, longo-cucurbitato, e viridi cinerea punctis ſubalbidis diſtincto, æſtivo.

P. fr. parvo, turbinato, ſcabro, e cinereo fulvaſtro, æſtivo.

*Le Muscat Royal.* Cette petite Poire a la peau rude & brune; ſa chair, ſans être fine, eſt demi-beurrée; ſon eau eſt douce & muſquée.

P. fr. parvo, pyriformi, partim flavo, partim pulchrè rubro æſtivo.

*La Jargonelle.* Sa chair eſt fine, demi-caſſante; ſon eau eſt un peu muſquée; elle eſt petite, mais bien faite, blonde & teinte de rouge.

P. f. parvo, pyriformi, partim viridi, partim obſcurè rubente æſtivo.

*Le Rousselet de Reims* à la forme & la couleur des Rouſſelets, ſa chair demi-beurrée, aſſez fine, eſt excellente; ſon eau a un parfum délicat, un goût agréable & un peu muſqué. Les terres légères conviennent beaucoup à ce Poirier.

P. fr. medio, ferè pyriformi obtuſo, hinc citrino, inde rubello & punctis rubris diſtincto, æſtivo.

*La Poire d'Ah! mon Dieu*, ou *la Poire d'Amour.* Ses belles couleurs l'ont pû faire ainſi nommer; elle eſt en deſſous d'un beau citron, d'un rouge pâle en deſſus avec des mouchetures plus rouges; elle eſt bien faite, un peu camuſe & de moyenne groſſeur; ſa chair demi-caſſante eſt fine, ſon eau abondante & ſucrée.

P. fr. magno, pyriformi glabro, lætè virente, maculis dilutè rubris diſtincto, æſtivo.

*Le fin Or de Septembre.* La chair de cette Poire eſt beurrée & fine, ſon eau a un aigrelet agréable; elle eſt plus groſſe & mieux faite que celle d'été, d'un vert gai, moucheté de taches d'un beau rouge.

P. fr. medio, pyriformi, cucurbitato, glabro lucido, partim lætè virente, partim dilutè rubeſcentè, æſtivo.

*L'Inconnue Cheneau.* Cette Poire, dite auſſi *Fondante de Breſt*, a la chair fine, caſſante; ſon eau eſt ſucrée & relevée d'un petit aigrelet fin, aſſez agréable: elle eſt bien faite, un peu en bouteille, ſa peau liſſe eſt luiſante, d'un vert gai, teinte en partie d'un beau rouge.

P. fr. medio, pyriformi-longo, viridi, verſùs pediculum flaveſcente, æſtivo.

*L'Epine d'Eté*, ou *Fondante muſquée.* Elle eſt bien faite, alongée, de couleur verte & blonde du côté de la queue; ſa chair eſt fondante, aſſez fine; ſon eau eſt relevée & très-muſquée: c'eſt une bonne Poire; Louis XIV lui en donnoit le nom.

*La Poire-Figue.* Sa groſſeur, ſa forme & ſa couleur lui font donner ce nom; ſa chair fondante eſt aſſez fine; ſon eau eſt douce & ſucrée.

P. fr. medio, pyriformi longiori, glabro, obſcure viridi, æſtivo.

*Le Bon-Chre'tien d'Ete'*, ou *Gracioli.* Sa chair eſt tendre, abondante en eau ſucrée; elle eſt d'un jaune agréable, groſſe, ſa forme pyrmidale, un peu camuſe, avec un petit renflement, plaît auſſi.

P. fr. magno, pyramidato-obtuſo, paululùm cucurbitato, glabr. flavo, æſtivo.

*L'Orange Tulipe'e*, ou *Poire aux mouches.* Cette Poire d'Orange, qui eſt groſſe & ovoïde, porte le nom de Tulipée à cauſe de ſes rayures d'un rouge gai ſur un fond en partie vert, en partie rouge foncé; ſa chair ſucculente eſt aſſez fine; quoique ſon eau ſoit légérement âcre, elle n'eſt pas déſagréable.

P. fr. magno ovoïdali, partim viridi, partim obſcurè rubro, tæniolis dilutiùs rubris, virgato, æſtivo.

*La Bergamotte d'Ete'*, autrement *le Milan de la Beuvriere.* Sa peau rude eſt d'un vert gai, mouchetée de points roux; cette Poire eſt groſſe, en toupie, ſa chair eſt demi-beurrée, aſſez fondante & ſujette à cotonner, ſi le fruit n'eſt cueilli un peu vert; on trouve dans ſon eau un aigre-fin agréable.

Pyr. fructu magno, turbinato, ſcabro, lætè virente, punctis fulvis diſtincto, æſtivo.

*La Bergamotte rouge*, ou *Craſanne d'été.* Elle eſt de groſſeur au-deſſous du médiocre, ſa forme en toupie comprimée, la couleur partie jaune & partie rouge; la chair de cette Poire eſt aſſez fondante, elle mollit promptement lorſqu'elle a mûri ſur l'arbre; ſon eau eſt relevée & parfumée: elle eſt bonne vers la mi-Septembre, parfaite en compotes.

Pyr. fr. vix medio, turbinato compreſſo, hinc flavo, inde rubro, æſtivo.

*La Verte longue*, ou *Mouille-bouche.* La chair de ce fruit eſt très-fondante, fine & délicate; ſon eau eſt abondante, douce, ſucrée, d'un goût & d'un parfum très-agréable; il mûrit au commencement d'Octobre.

Pyr. fructu magno, longo, viridi, autumnali.

*La Verte-longue panache'e*, ou *Suiſſe.* C'eſt une variété de la précédente; outre ſes rayures jau-

Pyr. fructu magno, longo, viridi tæ-

aiolis luteis virgato autum nali.

nes, elle eſt moins groſſe ; mais elle a d'ailleurs toutes ſes qualités.

Pyr. fructu maximo, ovoïdali, acuto, cinereo (aut viridi, aut rubente) autumnali.

*Le Beurré.* Cette Poire très-groſſe & en œuf pointu, eſt une des plus excellentes : ſa chair fondante eſt fine, délicate & très-beurrée, ſans devenir jamais pâteuſe ; elle abonde en eau ſucrée, relevée d'un goût aigrelet fin très-délicat. Ce fruit délicieux eſt cendré, quelquefois vert ou rougeâtre.

Pyr. fructu medio, ovoïdali-acuto, longo, glabro, è cinereo, viridi, æſtivo.

*L'Angleterre*, ou *Beurré d'Angleterre.* Elle n'eſt pas fort groſſe ; ſa forme plutôt alongée qu'ovale, a une petite pointe, & ſa peau liſſe eſt colorée d'un vert cendré.

Pyr. fructu magno, oblongo, citrino, autumnali.

*Le Doyenné*, ou *Beurré blanc*, dit auſſi *Poire de Saint-Michel* & de *Bonne-ente.* La chair de cette Poire eſt excellente & bien beurrée dans les années ſèches ; ſon eau eſt ſucrée, douce, quelquefois bien parfumée : on ſait qu'elle eſt groſſe, un peu alongée, & que ſa peau colorée de jaune citron eſt extrêmement fine.

Pyr. fructu medio, longulo, glabro, citrino, autumnali.

*Le Bezi de Montigni.* Sa groſſeur eſt médiocre, ſa forme longuette, & ſa peau liſſe eſt colorée de Citrin ; la chair de cette Poire eſt très-abondante & ſans pierre ; ſon eau eſt relevée d'un muſc agréable.

Pyr. fructu magno, rotundo-turbinato, ſpiſſiùs viridi, non nihil flaveſcente, autumnali.

*Le Bezi de la Motte.* Il eſt gros, de forme ronde, un peu en toupie ; ſa peau colorée d'un gros vert, jaunit cependant un peu ; ſa chair eſt fondante, ſans pierres ; ſon eau eſt douce & fort bonne : elle mûrit en Octobre & Novembre.

Pyr. fructu medio, turbibinato-ſubrotundo, tæniis flavis, viridibus & ſanguineis virgato autumnali.

*La Bergamotte Suisse.* Cette Poire de moyenne groſſeur eſt aſſez ronde, un peu en toupie, variée de bandes jaunes, vertes & de couleur de ſang ; ſon eau eſt ſucrée & abondante.

*La Bergamotte d'Automne* tient beaucoup de la précédente; ſes couleurs ne ſont cependant que blondes & rouſsâtres, & ſa forme eſt plus applatie; ſa chair beurrée eſt fondante, ſon eau fraîche eſt ſucrée & un peu parfumée: cette Poire mûrit en Octobre, Novembre & quelquefois plus tard; elle eſt très-bonne.

Pyr. fructu magno, turbinato-compreſſo, partim flaveſcente, partim dilutè rufeſcente, autumnali.

*La Bergamotte cadette*, dite *Poire de Cadet.* Ce gros fruit, qui eſt preſque fait en toupie, eſt coloré de jaune blond & d'un peu de rouge; ſa chair & ſon eau ſont agréables.

Pyr. fructu magno ſubturbinato, partim flaveſcente, partim leviter rubente autumnali.

*La Poire de Jalousie.* Elle eſt groſſe, comprimée; ſa peau, qui eſt couleur de noiſette, eſt élevée de papilles comme le chagrin; il faut cueillir ce fruit un peu vert, alors ſa chair ſera très-beurrée & beaucoup moins ſujette à mollir; ſon eau eſt abondante, ſucrée & relevée d'un parfum excellent.

Pyr. fructu magno, diametro compreſſo, papulato, avellaneo colore, autumnali.

*La Poire Franchipanne.* Sa chair demi-fondante eſt bonne & ſans marc; ſon eau douce & ſucrée, d'un goût comparé à celui de la Franchipanne; elle eſt agréable au goût & flatte beaucoup la vue.

Pyr. fructu medio, longo paululùm cucurbitato, partim citrino, partim intenſè rubro, autumnali.

*La Poire de Lansac, Dauphine* ou *Satin.* Elle eſt au plus de moyenne groſſeur, ronde, ſa peau blonde eſt liſſe & ſatinée; ſa chair eſt fondante, ſon eau ſucrée, d'un goût agréable & parfumée: elle ſe conſerve ſouvent juſqu'en Janvier.

Pyr. fructu vix medio, rotundo, glabro, flavo, autumnali.

*La Poire de Vigne*, ou *Poire Demoiſelle.* Il faut la cueillir un peu verte, pour qu'elle ſoit moins ſujette à mollir; ſa chair eſt beurrée, un peu fondante, ſon eau eſt fort bonne & d'un goût bien relevé; elle eſt petite, d'un gros vert & à queue extrêmement longue.

Pyr. fructu parvo, ſpiſſiùs cinereo, pediculo longiſſimo, autumnali.

*La Pastorale*, ou *Muſette d'Automne.* Sa chair

Pyr. fructu

magno, longiori, cinereo, maculis rufis distincto, autumnali.

est fondante ; son eau est musquée & très-bonne : cette Poire cendrée & tachetée de roux, est grosse & alongée ; elle mûrit en Octobre, Novembre & Décembre.

Pyr. fructu magno subrotundo, obscurè flavescente, (vel cinereo, vel albido) autumnali.

*Le Messire-Jean doré.* Cette Poire est grosse, assez ronde, colorée d'un jaune foncé, quelquefois cendrée ou blanche ; sa chair est cassante, son eau abondante, d'un goût très-relevé & excellent.

P. fr. medio, longissimo, hinc luteo, inde pulchrè & saturè rubro, autumnali.

*La Bellissime d'Automne*, ou *Vermillon.* Elle est de grosseur médiocre, très-longue, colorée de jaune, de rouge vif & de rouge brun ; sa chair est cassante, son eau douce, relevée & abondante.

Pyr. fructu medio, oblongo, glabro, viridi autumnali.

*Le Sucré-vert*, de grosseur médiocre & alongé, a la peau lisse & verte ; sa chair est beurrée ; il a souvent quelques pierres autour des pepins ; son eau est sucrée & d'un goût délicat.

Pyr. fructu magno, pyramidato-obtuso-incurvo, flavescente maculis fuscato, æstivo.

*La Mansuette*, ou *Poire de Solitaire.* Sa chair demi-fondante est assez fine, son eau abondante relevée d'une légère âcreté ; cette Poire est grosse, de forme pyramidale, camuse & un peu courbée, blonde & marquée de taches rousses. Elle mûrit en Septembre, Octobre, &c.

Pyr. fructu parvo, pyriformi-cucurbitato, autumnali.

*La Poire Rousseline.* Le tems de sa maturité est en Décembre : elle est petite & renflée en bouteille ; sa chair est fine, demi-beurrée & délicate ; son eau sucrée, musquée & très-agréable.

Pyr. fructu maximo, pyramidato-acuto, hinc e viridi flavescente, inde splendide rubro autumnali.

*Le Bon-Chrétien d'Espagne.* Cette Poire, aussi grosse que le Bon-Chrétien, est plus alongée, & a des couleurs plus vives ; elle est plus ou moins bonne suivant les années & les terreins ; elle est sèche, dure & cassante, ou tendre & pleine d'eau, douce & de bon goût.

*La Crasanne*, ou *Bergamotte Craſanne.* On ſait qu'elle eſt groſſe, ronde & d'un vert cendré; ſa chair eſt très-fondante & beurrée; ſon eau eſt fort abondante & parfumée; elle eſt relevée d'une petite âpreté qui ne déplaît pas : tout le monde connoît ſon mérite.

Pyr. fructu magno, rotundo, e viridi cinereo, autumnali.

*La Crasanne pannache'e.* C'eſt une variété de la précédente, qui n'en différe pas par le fruit, ſi ce n'eſt qu'il eſt moins gros.

Pyr. foliis per limbos albis, fructu medio, rotundo, e viridi cinereo, autumnali.

*Le Bezi de Cressoi*, ou *Rouſſette d'Anjou.* Elle eſt petite, arrondie & verte tachetée de rouſsâtre; ſa chair eſt tendre & beurrée, & ſon eau fort agréable.

Pyr. fructu parvo, ſubrotundo, viridi, maculis ſubfuſcato, autumnali.

*Le Doyenne' gris* moins gros, plus court & plus tardif que le Doyenné proprement dit, dont il diffère auſſi par ſa couleur verte cendrée; ſa chair eſt beurrée, fondante & ne ſe cotonne point; ſon eau eſt très-ſucrée & d'un goût fort agréable.

Pyr. fructu medio, ſubrotundo glabro, e viridi cinereo, autumnali.

*La Merveille d'hiver*, ou *le petit Oin.* Ce Poirier dans une bonne expoſition, donne un excellent fruit; ſa chair eſt d'un beurré très-fin, fondante, ſans pierre & ſans marc; ſon eau eſt ſucrée, muſquée & d'un goût très-agréable : il eſt de moyenne groſſeur, demi-ovale, ſa peau verdâtre eſt rude au toucher.

Pyr. fructu medio ſubovato ſcabro, ſubviridi, autumnali.

*L'Epine d'hiver.* La chair de cette Poire eſt fondante, délicate & d'un beurré très-fin; ſon eau eſt douce, muſquée & d'un goût délicieux : elle eſt groſſe, longue; ſa peau eſt liſſe & d'un vert blanc.

Pyr. fructu magno, longo, glabro, viridi albeſcente, autumnali.

*La Louise-bonne.* Cette Poire eſt groſſe, pyramidale; ſa peau liſſe eſt d'un vert pâle, ſa chair demi-beurrée n'eſt point ſujette aux pierres, ni à mollir; ſon eau eſt abondante & douce.

Pyr. fructu magno, pyramidato glabro, e viridi albido, autumnali.

Pyr. fructu medio, pyriformi-acuminato, hinc melino, inde intenſe rubro, autumnali.

*Le Martin sec.* On ſait que cette Poire bien faite, de moyenne groſſeur & pointue par ſa queue, eſt d'un rouge foncé en deſſus & d'un jaune rouge en deſſous; ſa chair eſt fine, caſſante, ſon eau ſucrée, parfumée & agréable.

Pyr. fructu magno, pyramidato propè pyriformi, flaveſcente autumnali.

*La Marquise.* Sa couleur eſt blonde, ſa forme groſſe pyramidale avec un renflement aſſez marqué; la chair de cette Poire eſt beurrée & fondante; ſon eau eſt ſucrée, douce, rarement muſquée.

Pyr. fructu medio, ovato ſubflaveſcente autumnali.

*L'Echassery*, ou *Bezi de Chaſſerie.* Ce fruit médiocre, ovale, aſſez blond, a la chair fine, fondante & beurrée, ſon eau eſt ſucrée, muſquée & d'un goût agréable : cette Poire eſt très-bonne.

Pyr. fructu medio, ſubovato, albido, autumnali.

*L'Ambrette* a la chair fine & fondante; ſon eau eſt ſucrée & excellente, elle eſt de groſſeur médiocre & de forme preſqu'ovale.

Pyr. fructu magno, ſubovoïdali, hinc citrino, inde pulchre rubro, brumali.

*Le Bezi de Chaumontel*, ou *Beurré d'hiver.* Sa chair demi-beurrée eſt fondante & très-bonne; ſon eau ſucrée eſt relevée & agréable, le tems de ſa maturité varie; il s'en conſerve ordinairement juſqu'à la fin de Février : cette Poire aſſez groſſe, plus courte qu'ovale, a la peau colorée de jaune citron & d'un beau rouge.

Pyr. fructu magno, ovato, glabro, hinc ſature rubro, inde dilute viridi, autumnali.

*La Poire de Vitrier* eſt groſſe, ovale, liſſe, mi-partie d'un vert gai & d'un rouge foncé; ſa chair eſt peu fine, mais ſon eau d'un goût agréable.

Pyr. fructu magno, longo, incurvo, partim citrino, partim rufeſcente, brumali.

*La Bequesne.* Cette Poire groſſe, alongée & de forme courbe eſt très-bonne cuite & en compote; ſa peau eſt colorée de jaune citron & en partie de rouſsâtre; ſa chair eſt moëlleuſe, ſon eau très-abondante eſt ſans âcreté.

P. fr. medio,

*Le Bezi d'Heri.* Sa groſſeur eſt médiocre; la

forme arrondie, ſa peau eſt liſſe, en partie jaune & en partie d'un vert blanc : cette Poire n'eſt paſſable que dans les bonnes terres fortes.

ſubrotundo, glab. hinc luteo, inde e viridi ſubalbido, autumnali.

*Le Franc-Re'al* eſt gros & pointu par les deux bouts, verdâtre, marqué de taches de rouſſeur; cette Poire eſt très-bonne cuite.

Pyr. fructu magno, utrinque acuto, ſubvireſcente, maculis furfuraceis, diſtincto, autumnali.

*Le Saint-Germain*, qu'on a auſſi nommé *l'Inconnue La Fare.* Son eau eſt abondante & excellente, ſa chair eſt beurrée & fondante; cette Poire commence ſur la fin de Novembre & dure juſqu'en Mars & Avril; elle eſt groſſe, de forme pyramidale, verte, pointillée de taches rouſſes.

P. fr. magno, pyramidato, viridi fuſcis punctis diſtincto, brumali.

*La Virgouleuse.* La chair de cette Poire eſt tendre, beurrée & fondante, ſon eau eſt abondante, douce, ſucrée & relevée; c'eſt une des plus excellentes Poires; elle eſt groſſe, de forme pyramidale camuſée, à peau liſſe, d'un jaune citron.

P. fr. magno, pyramidato obtuſo, glabro, citrino brumali.

*La Poire de Jardin.* Elle eſt groſſe, en forme d'orange & mi-partie de jaune & d'un beau rouge foncé; la chair de ce fruit, qui eſt fort bon, eſt demi-caſſante, un peu groſſière; ſon eau eſt ſucrée & fort agréable.

P. fr. magno, aurantii formâ partim flavo, partim pulchre & ſature rubro, brumali.

*La Royale d'hiver.* Sa chair eſt demi-beurrée, fondante, très-fine; ſon eau eſt ſucrée dans les terreins ſecs & chauds, elle mûrit en Décembre, Janvier & Février; cette Poire eſt bien faite, groſſe, liſſe, colorée d'un jaune citron & en partie d'un rouge agréable.

P fr. magno, pyriformi, glabro, partim citrino, partim ſuave-rubente, brumali.

*L'Angleterre d'hiver.* Cette Poire eſt bien faite & alongée ſans être groſſe; ſa peau citrine eſt mouchetée de taches jaunes; ſa chair eſt très-beurrée,

P. fr. medio, pyriformi-longo, citrino,

maculis flavis superſparſis, brumali.

ſans marc & ſans pierres ; ſon eau eſt douce & agréable ; après le point de ſa maturité, qui eſt au tems de la précédente, elle ne tarde pas à mollir.

P. f. magno, pyramidato-compreſſo, glabro, partim rubente, partim e citrino ſubalbido, brumali.

*L'Angélique de Bordeaux.* Lorſque ce fruit eſt mûr, ſa chair eſt caſſante & bien tendre ; ſon eau eſt douce & ſucrée ; cette Poire ſe garde long-tems ; elle eſt un peu moins groſſe que le Bon-Chrétien, elle en tient par la couleur & la forme, plus applatie cependant & d'un jaune plus pâle.

P. f. parvo, longo utrinque acuto, luteo, non nihil rubente, brumali.

*Le Saint-Augustin.* Sa chair eſt ordinairement ferme, ſon eau eſt muſquée, & dans les bons terreins abondante & parfumée ; cette Poire eſt petite, longue & pointue par les deux bouts ; jaune avec un peu de rouge.

P. f. magno, longiori, dilutè virente, brumali.

*Le Champ riche d'Italie.* Il eſt gros, de forme alongée & d'un beau vert, ſa chair eſt demi-caſſante ſans pierres : ce fruit eſt très-bon cuit & en compotte.

P. fr. maximo, pyriformi-obtuſo, viridi, maculis rufeſcente, brumali.

*La Poire de Livre.* Cette Poire des plus groſſes, de forme réguliere, un peu camuſe, & de couleur verte avec des taches rouſſes, eſt excellente cuite, lorſque ſon eau eſt adoucie par ſa maturité, qui plus ſerrée que celle du Catillac, ne dure qu'en Décembre, Janvier & Février.

Pyr. fr. omnium maximo, utrinque acuto citrino, ſuperſparſis maculis fulvis, brumali.

*Le Trésor*, ou *la Poire d'Amour.* C'eſt la plus groſſe de toutes les Poires ; elle eſt pointue par les deux bouts, colorée de citron, tachetée de marques fauves ; la chair de ce fruit eſt tendre & preſque fondante lorſqu'elle eſt bien mûre ; ſon eau eſt abondante & douce ſans âcreté : cette Poire qui peut ſe manger crue eſt excellente cuite.

P. f. medio, longulo, ſca-

*L'Angélique de Rome.* Sa forme eſt alongée, ſa peau raboteuſe eſt jaune & teinte d'un peu de

rouge; cette Poire eſt groſſe, belle & bonne : dans un bon terrein un peu humide ſon eau ſera abondante, ſucrée & relevée; dans une terre ſèche ce fruit ſera médiocre en volume & en bonté, ſa chair ſera caſſante & pierreuſe.

bro, luteo, paululum rubeſcente, brumali.

*Le Martin Sire*, ou *la Ronville*. Elle eſt groſſe, bien faite, alongée; ſa peau eſt verte & liſſe; ſa chair eſt caſſante; il y a quelquefois des pierres auprès des pepins : ſon eau eſt douce, ſucrée, quelquefois un peu parfumée.

P. f. magno, pyriformi-longo, glabro, viridi, brumali.

*La Bergamotte de Pasques*, ou *Bergamotte d'hiver*, très-groſſe, plutôt ronde qu'en toupie, colorée de vert & de roux; ſa chair eſt demi beurrée, ſon eau aſſez abondante, relevée d'un leger aigrelet qui ne déplaît pas : ce fruit mûrit en Janvier, Février & Mars.

P. fr. maximo, rotundo-turbinato, hinc viridi, inde leviter rufeſcente, brumali.

*Le Colmart*, ou *Poire Manne*. Ce fruit eſt très-gros, en forme de pyramide très-courte; il eſt vert & coloré d'un beau rouge du côté du ſoleil, ſa chair eſt bien fine, beurrée & fondante; ſon eau eſt très-douce, ſucrée & relevée : enfin cette Poire eſt excellente, & dure quelquefois juſqu'en Avril.

P. fr. maximo, pyramidato ad turbinatum accedente, hinc viridi, indè dilutiùs rubente, brumali.

*La Bellissisme d'hiver*. Sa chair eſt tendre, très-moëlleuſe étant cuite; ſon eau eſt douce, abondante, ſans âcreté, relevée d'un petit goût de ſauvageon : cette belle Poire ſe conſerve juſqu'en Mai, elle eſt prodigieuſement groſſe, preſque ronde, ſa peau liſſe & blonde eſt colorée d'un fort beau rouge.

Py. fr. quàm maximo, ſub-rotundo, glabro, partim flavo, partim pulchrè-rubro ſerotino.

*Le Tonneau*. Cette Poire doit ſon nom à ſa forme; elle eſt très-bonne cuite & en compotes, elle eſt de couleur citrine & colorée en partie d'un beau rouge.

P. fr. maximo dolioli formâ, partim citrino, partim pulchrè rubente, brumali.

*La Poire Donville*. Elle eſt de moyenne groſ-

P. fr. medio,

utrinque acuto, glabro, hinc citrino, inde rubro, brumali.

ſeur, pointue par les deux bouts; ſa peau eſt liſſe, citrine en partie, & en partie rouge; ſa chair eſt caſſante & ſans pierres; ſon eau, quoiqu'un peu âcre, eſt relevée & aſſez agréable: ce fruit eſt fort bon cuit; il peut être mangé crud, & ſe conſerve juſqu'en Avril.

P. fr. medio, pyriformi partim citrino, partim pulchre & intenſe rubro, brumali.

*Le Trouvé*, ou *la Poire de Prince*, dit auſſi *Trouvé de Montagne*. La chair de cette Poire eſt caſſante, ſans pierres, ſon eau eſt abondante, ſucrée & agréable: lorſque ce fruit eſt bien mûr, il ſe mange crud, & eſt excellent cuit & en compotes; ſa groſſeur eſt moyenne, ſa forme régulière; ſes couleurs en partie jaune citron, en partie d'un beau rouge foncé.

P. fr. maximo, pyramidato-truncato, partim citrino, partim dilute rubente, brumali.

*Le Bon-Chrétien d'hiver*. Cette Poire, à laquelle on donne ordinairement l'honneur de la prééminence, eſt extrêmement groſſe, de la forme d'une pyramide tronquée, colorée de citron & de rouge; quoique ſa chair ſoit caſſante, elle eſt tendre & fine, ſon eau abondante, ſucrée, douce & un peu vineuſe.

P. fr. maximo, plerumque pyriformi obtuſo, partim buxeo, partim obſcure rubente, ſerotino.

*Le Catillac*. Il eſt auſſi gros & de même forme que la Poire de livre; il a la peau couleur de buis & en partie d'un rouge obſcur; cette Poire eſt très-bonne cuite & prend une bonne couleur au feu; elle eſt d'uſage juſqu'en Mai.

P. fr. parvo, pyriformi, partim viridiori, partim obſcure rubente, brumali.

*Le Rousselet d'hiver*. C'eſt un vrai Rouſſelet par ſa forme & ſa couleur, ſa chair eſt demi-caſſante, & laiſſe un peu de marc dans la bouche; ſon eau eſt aſſez abondante & d'un goût aſſez relevé.

P. f. med. aurantii formâ, compreſſo, ſpiſſiùs virente, brumali.

*La Poire d'Orange d'hiver*. Sa chair eſt fine, caſſante & ſans pierres, l'eau eſt très-muſquée & aſſez agréable: elle mûrit en Février, Mars & Avril.

P. fr. magno, prope pyrifor-

*La Bergamotte de Soulers*, ou *Bonne de Soulers*. Elle eſt groſſe, aſſez bien faite, colorée de

blond & d'un rouſsâtre gai ; ſa chair eſt fondante, beurrée & ſans pierres, ſon eau ſucrée eſt d'un goût fort agréable.

mi, hinc flavescente, inde dilute rufescente, brumali.

*Le Poirier double-fleur.* Au petit mérite d'avoir ſes fleurs ſemi-doubles, ce Poirier joint celui d'avoir le fruit gros, de forme applatie en toupie, la peau liſſe, bien colorée de vert & de rouge foncé ; ſa chair abondante en eau eſt ſans pierres & prend beaucoup de couleurs au feu ; cette Poire eſt très-bonne cuite & en compotes.

P. flore semi-pleno, fructu magno, turbinato-compresso, glabro partim viridi, partim intense rubro, brumali.

*La Double-fleur panache'e.* Cette Poire, plus arrondie que la précédente, eſt agréablement rayée de bandes vertes & de bandes blondes, & mouchetée de taches rouges.

P. flore semipleno, fructu magno rotundo, compresso, viridibus & flavis tæniis & maculis rubris distincto, brumali.

*La Poire de Pretre.* Sa chair eſt demi-caſſante, aſſez fine ; ſon eau a un petit goût aigrelet qui plaît ; ſa couleur eſt un vert cendré ; elle eſt groſſe & preſque de la forme d'une pomme,

P. fr. magno, ad mali formam accendente, e viridi cinereo, brumali.

*La Poire de Naples.* Elle eſt de moyenne groſſeur & un peu renflée en courge, ſa peau liſſe eſt blonde & en partie légérement teinte de rouſsâtre ; ſa chair eſt demi-caſſante, quelquefois un peu beurrée ; ſon eau eſt douce & agréable.

P. fr. modio, non nihil cucurbitato, glabro, hinc flavescente, inde leviter rufescente brumali.

*Le Chat-brule'.* Cette Poire eſt fort belle, ſa chair eſt fine & prend une fort jolie couleur au feu ; elle eſt propre à faire d'excellentes compotes : ſa peau eſt agréablement colorée de rouge & en partie de jaune.

P. fr. medio, pyriformi, glabro, splendido, partim citrino, partim pulchre & dilute rubente, brumali.

*Le Muscat l'Allemand.* Sa chair eſt beurrée & fondante ; ſon eau eſt muſquée & aſſez relevée : cette Poire ſe conſerve ſouvent juſqu'en Mai ; elle eſt

P. fr. magno, pyriformi, partim cinereo, partim

rubro, ſerotino. groſſe, bien faite, colorée de rouge & de gris cendré.

P. f. medio, pyramidato-obtuſo, glabro, viridi, ſerotino. *L'Impériale à feuilles de Chêne.* Elle eſt liſſe, verte, de moyenne groſſeur & de forme pyramidale un peu camuſe; ſa chair eſt demi-fondante, ſon eau eſt ſucrée & bonne : elle mûrit en Avril & Mai.

P. fr. medio, ferè pyriformi, flavo, ſerotino. *Le Saint-Pere*, ou ſelon d'autres, *Saint-Pair.* Sa forme eſt régulière, ſa couleur blonde & ſa groſſeur moyenne; ſa chair eſt tendre & ſon eau abondante : cette Poire qui peut ſe manger crue dans ſa parfaite maturité, eſt excellente cuite & en compotes; elle commence à mûrir en Mars & ſe conſerve juſqu'en Juin.

P. fr. magno, turbinato, partim viridi, partim rubro, maximè ſerotino. *La Poire a Gobert*, ou *d'Angobert.* Cette Poire, qui ſe garde juſqu'au mois de Juin, eſt groſſe, formée en toupie, ſa peau eſt verte & rouge, ſa chair muſquée & demi-caſſante.

P. fr. maximo, prope turbinato, viridi, maximè ſerotino. *La Bergamotte de Hollande*, *Amoſelle*, ou *Bergamotte d'Alençon.* Elle eſt auſſi très-groſſe, verte & en toupie; ſa chair eſt très-bonne & demi-caſſante, ſon eau eſt abondante, agréable & aſſez relevée; enfin elle ſe peut garder juſqu'en Juin, & mérite d'être cultivée.

P. fr. medio, longiſſimo e flavo ſubvireſcente, maculis fulvis diſtincto, ſerotino. *La Poire de Tarquin.* Sa chair eſt caſſante, fine & aqueuſe, ſon eau eſt d'un goût aigrelet aſſez agréable; elle eſt moyennement groſſe & très-allongée, ſa peau eſt colorée d'un vert pâle & marquée de taches rouſſes.

P. fr. medio, utrinque acuto, hinc luteo, inde obſcure rubeſcente, maxime ſerotino. *Le Sarasin* eſt de moyenne groſſeur, pointu par les deux bouts, jaune en partie & en partie rouge; ſa chair eſt ſans pierres demi-beurrée dans ſon extrême maturité, ſon eau eſt ſucrée, relevée & un peu parfumée; cette Poire eſt excellente cuite & en compotes, & ſe garde plus long-tems qu'aucune autre.

LES

## LES COIGNASSIERS.

ENTRE autres le *COIGNASSIER*, ou *COIGNIER DE PORTUGAL*, dont les fruits ſont admirables pour leur beauté.

## LES POMMIERS.

*LE CALVILLE D'ETÉ.* Cette Pomme mûrit à la fin de Juillet; mais on la mange en compotes au commencement de ce mois, ſa maturité diminuant ſon mérite, parce qu'elle devient cotonneuſe : elle eſt d'une forme conique, à côtes petites & d'un rouge agréable.

Malus fructu parvo, ſubconico, coſtato, pulchrè rubro præcoci.

*LA POSTOPHE D'ÉTÉ.* Elle reſſemble beaucoup au Calville par ſon goût & ſa chair grainue ; cette Pomme, qui mûrit vers la fin de Juillet, eſt rouge & de moyenne groſſeur ; on remarque qu'elle ne renferme que quatre logettes au lieu de cinq.

Malus fructu medio, rubro, quadriloculari, carne granoſâ æſtivo.

*LA PASSE-POMME ROUGE.* Quoiqu'elle ne ſoit en parfaite maturité qu'au mois d'Août, on peut l'employer en compotes au tems du Calville d'Eté. Elle eſt d'un beau rouge, petite & platte.

Il y a en outre une *Paſſe-pomme d'Automne*, dite Pomme d'*Outre-paſſe*, ou *Générale*, & une troiſième qui eſt la *Paſſe-pomme blanche*.

Malus fructu parvo, globoſo-compreſſo, pulchrè rubro æſtivo.

*LE RAMBOUR FRANC.* C'eſt une des plus groſſes Pommes, de forme applatie, de couleur blanche fouettée de rouge ; ſa chair eſt un peu groſſiere, mais

Malus fructu maximo-compreſſo, albido, tæniolis

rubris virgato autumnali.

étant cuite, elle eſt légère & fort bonne; ſon eau eſt d'un aigrelet que le feu émouſſe & rend agréable; elle mûrit au commencement de Septembre & dure juſqu'à la fin d'Octobre; cuite & en compotte elle eſt très-eſtimée.

Malus fructu medio, oblongo, rubello, tæniolis intenſe rubris virgato, autumnali.

*Le Pigeonnet.* Cette Pomme eſt très-eſtimée, quoiqu'elle ne ſe conſerve que juſqu'en Novembre; elle eſt de moyenne groſſeur, allongée, rougeâtre & fouettée de bandes plus rouges : ſa chair eſt blanche, fine & très-agréable au goût.

Malus fructu medio, compreſſo, luteo, acidè dulci, autumnali.

*La Reinette jaune hative.* La chair de cette Pomme eſt tendre, un peu ſujette à devenir cotoneuſe, ſon eau abondante, moins relevée que celle des autres Reinettes; c'eſt cependant une des meilleures Pommes de ſa ſaiſon; mais elle a le défaut de ne durer que juſqu'au commencement d'Octobre.

Malus fructu medio, aureo, inodoro, autumnali.

*Le Fenouillet jaune*, dit *Drap d'Or* pour ſa belle couleur. Il tient des autres Fenouillets, ſa chair eſt blanche, ferme ſans marc & preſque ſans odeur, plus délicate que celle du Fenouillet gris; ſon eau douce, relevée, fort agréable; on regarde avec raiſon cette Pomme, comme une des meilleures; mais elle paſſe rarement le mois de Novembre ſans ſe pourrir, & trop mûre elle eſt cotonneuſe.

Malus fructu magno, glabro, formâ eximiâ, rutilato, autumnali.

*Le vrai Drap-d'or.* La chair de cette Pomme eſt légère, un peu grenue, ſujette à devenir cotonneuſe; elle ſe conſerve juſqu'à la fin de Décembre & ſe fait regretter en nous quittant. Sa forme eſt très-belle & ſa peau liſſe d'un jaune doré brillant.

Malus fructu medio, ſaturè rubro, punctis flavis diſtincto, acidè dulci, autumnali.

*La Reinette de Bretagne.* Ce fruit eſt très-bon & ſe conſerve quelquefois juſqu'à la fin de Décembre; ſa peau fort rouge eſt piquetée de points jaunes; ſa chair ferme, caſſante, d'un blanc qui tire ſur le jaune & fort odorante. Son eau eſt abondante,

ſucrée, relevée, quoique moins aiguiſée d'aigrelet que les bonnes Reinettes.

*Le Calville rouge.* On la connoît pour une groſſe Pomme à côte dont la peau eſt d'un rouge foncé, la chair grainue eſt teinte de roſe, ſon eau eſt d'un goût relevé, vineux & agréable; on croit y ſentir une petite odeur de violette. Mais comme la commune ne ſe garde pas long-tems, on doit lui préférer la Calville rouge Normande de Merlet qui ſe conſerve juſqu'à la fin de Mars.

Malus ſativa fructu magno, intenſe rubente violæ, odore.

*Le Fenouillet gris*, ou *Anis.* La chair de cette Pomme eſt tendre, fine, ſans odeur; mais ſon eau eſt ſucrée & parfumée de fenouil dans le point de maturité où elle commence à faner: plus tard elle ſeroit cotonneuſe; cette Pomme mûrit en Décembre & ſe garde juſqu'en Février; c'eſt une variété du gros Fenouillet, dont elle ne diffère que par la groſſeur & par le goût un peu moins relevé; ſa couleur eſt un jaune brun.

Malus fructu parvo, fulvaſtro, inodoro, brumali.

*Le Fenouillet rouge*, *Bardin*, ou *Courpendu de la Quintinie.* Il eſt diſtingué du Fenouillet gris par ſa peau plus foncée, fouettée d'un rouge brun du côté du ſoleil, & par ſa queue, qui eſt groſſe & fort courte, d'où elle eſt nommée Courpendue; ſa chair eſt plus ferme, d'un goût plus relevé & plus ſucré. Elle ſe conſerve auſſi plus long-tems, quelquefois juſqu'à la fin de Février.

Malus fructu medio, cinereo, maculis rubro-fuſcis ad ſolem diſtincto, brumali.

*Le Pommier doux*, *Doux à trochet.* Elle eſt médiocre en groſſeur, allongée en pain de ſucre, de couleur verte fouettée de rouge; la chair de cette Pomme eſt ferme, ſans marc, ayant peu d'odeur; ſon eau eſt douce, fort agréable & peu relevée; ce fruit, qui n'eſt point aſſez commun dans ces cantons, mûrit en Décembre & ſe garde long-tems.

Malus fructu medio (vel parvo) ſubconico, viridi, cineis e vanide rubris virgato, brumali.

Malus fructu medio, conico, glabro, roseo, quadriloculari, brumali.

*Le Pigeon*, *Cœur de Pigeon*, ou *Pomme de Jéruſalem.* C'eſt une très-jolie pomme à la vue & au goût; elle eſt de moyenne groſſeur, en pain de ſucre; ſa peau eſt liſſe, couleur de roſe, ſa chair fine très-délicate, grainue, légère, ferme & blanche; ſon eau a une acidité agréable. On obſerve qu'elle n'a que quatre logettes.

Malus fructu magno, compreſſo, glabro, ſaturè rubro, brumali.

*Le gros Faros.* Sa chair eſt ferme, fine, ſon eau très-bonne, abondante & relevée; c'eſt une excellente pomme, qui ſe conſerve juſques vers la fin de Février; elle eſt groſſe, applatie, liſſe & d'un rouge foncé.

Malus fructu medio oblongo, glabro, purpureo, brumali.

*Le petit Faros.* Cette Pomme très-bonne ſe conſerve auſſi juſqu'en Février; elle eſt moins groſſe, allongée, liſſe & de couleur pourprée; ſa chair eſt blanche, un peu grainue, & ſon eau des plus agréables.

Malus fructu medio, compreſſo, flavo, acidè, dulci, brumali.

*La Reinette dorée*, ou *Reinette jaune tardive.* Cette Pomme trop rare eſt comparable à la Reinette franche; elle mûrit en Décembre & ſe paſſe en Février quand l'autre commence; ſa chair eſt blanche, ferme, fine, odorante, ſon eau abondante, très-ſucrée & preſque ſans acide.

Malus fructu medio, aureo, acidè dulci, brumali.

*La Pomme d'Or*, ou *Reinette d'Angleterre.* Elle tient de la Reinette franche pour ſa chair; ſon eau eſt abondante, d'un goût ſucré & bien relevé; elle eſt excellente & mérite de devenir commune.

Malus fructu maximo, coſtato, e viridi luteo, acide dulci, brumali.

*La groſſe Reinette d'Angleterre.* En effet elle eſt très-groſſe, à côtes relevées & d'un vert jaunâtre; c'eſt une très-belle pomme; mais ſa chair eſt moins ferme que celle de la Reinette franche, & ſon eau un peu moins relevée : elle mûrit auſſi en Décembre, Janvier & Février.

*L'Api.* Sa chair ſans odeur eſt très-fine, blanche, croquante, ſans marc & ne ſe fanne point; l'eau en eſt douce, fraîche & agréable; cette jolie pomme ſe conſerve ſouvent juſqu'en Mai : ſa peau liſſe & brillante colorée en partie d'un vert jaunâtre, & en partie du plus beau rouge pourpré, fait l'ornement des deſſerts de cette ſaiſon.

Malus fructu parvo, glabro, hinc ſubflaveſcente, indè ſplendide purpureo inodoro, brumali.

*L'Api noir.* On cultive peu cet arbre, dont le fruit n'a pas les qualités du précédent; car il ſe conſerve moins long-tems & eſt un peu ſujet à ſe cotonner, ſa couleur très-brune eſt ſon ſeul mérite.

Malus fructu parvo, compreſſo, glabro nigricante, inodoro, brumali.

*Le Pommier nain de Reinette.* Ce pommier greffé ſur ſauvageon ou ſur Doucin, reſte plus nain que les autres eſpeces ſur Paradis; & lorſqu'il eſt greffé ſur ce dernier, il égale à peine un pied de giroflée : ſon fruit paroît être une variété de la Reinette blanche, ayant ſa forme, ſa couleur, ſa conſiſtance & ſon goût.

Malus pumila fructu medio, albido, acidè dulci, brumali.

*La Reinette blanche.* Sa chair eſt blanche, tendre, très-odorante; elle ſe cotonne plutôt qu'elle ne ſe fanne; ſon eau abondante eſt d'un goût agréable peu relevé; cette Pomme mûrit en Décembre, & ne paſſe pas le mois de Mars.

Malus fructu vix medio, albido, acidè dulci, brumali.

*La Non-pareille.* Cette Pomme eſt groſſe, applatie, d'un vert blond, ſa chair tendre, ſon eau agréable, relevée d'un peu d'acide, ſon goût approche de celui de la Reinette, cette Pomme eſt très-bonne; elle mûrit en Janvier, Février & Mars.

Malus fructu magno, compreſſo, e viridi flaveſcente, acidulo, brumali.

*Le Capendu.* Elle eſt petite & mi-partie d'un rouge brun & d'un rouge pourpré; cette Pomme, qui ſe conſerve juſqu'à la fin de Mars, a la chair fine, l'eau aigrelette & fort agréable.

Malus fructu parvo, hinc atro-rubente, inde purpuraſcente, brumali.

*La Haute-bonté.* Sa forme eſt celle de la pré-

Malus fructu

magno, compresso, costato, lætè viridi brumali.

cédente, elle s'en distingue par ses côtes & par un vert plus gai, sa chair est tendre, délicate, fort odorante; son eau abondante est relevée d'un aigrelet fin. Cette Pomme se conserve jusqu'en Avril.

Malus fructu minimo, globoso, glabro, nigricante, inodoro, brumali.

*La Pomme noire.* Sa chair est blanche, sans odeur; son eau fraîche est douce : cette petite Pomme, qui se conserve long-tems, est encore plus noire que l'Api noir.

Malus fructu medio, compresso, e cinereo fulvastro, inodoro, brumali.

*La Reinette grise de Champagne.* Ceux qui n'aiment pas l'odeur & l'acidité des autres Reinettes, leur préférent celle-ci; sa chair cassante a peu d'odeur; mais son eau est sucrée & fort agréable : cette Pomme se garde long-tems.

*La Pomme-poire*, qu'on ne comprend pas parmi les bons fruits, est par sa forme & sa couleur assez semblable à certaines Reinettes grises; on ne la regarde cependant pas comme une variété, sa chair est plus dure, sèche & d'un goût moins relevé; son mérite consiste en ce qu'elle se conserve long-tems.

Malus fructu magno, hinc rubro, inde albido, acidè-dulci, brumali.

*La Reinette rouge.* Outre sa couleur mi-partie de blanc & de rouge, sa chair d'un blanc un peu jaunâtre, & son eau d'un aigrelet plus relevé que celle de la Reinette franche, la distinguent de cette derniere avec laquelle plusieurs la confondent; elle paroît en être une variété & lui est peu inférieure; mais elle ne dure pas aussi long tems.

Malus fructu maximo, compresso, hinc albido, inde flavo, punctis & tæniolis sanguineis distincto, brumali.

*Le Rambour d'hiver.* Quoiqu'elle ait un petit retour d'âcreté, elle est fort bonne cuite ou en compottes, sa chair est tendre. Elle se conserve jusqu'en Mars; sa couleur est en partie blanche & en partie jaune, elle a aussi des points & des lanieres d'un rouge sanguin.

Malus fructu medio, lon-

*La Pomme violette.* Cette Pomme de moyenne grosseur & fort alongée a la chair fine & délicate;

ſon eau qui tient un peu de celle du Calville, eſt ſucrée, douce & un peu parfumée de violette; on peut la regarder comme une des meilleures Pommes: il s'en garde juſqu'en Mai.

giori, ſapore violæ, ſerotino.

*Le gros Api*, ou *Pomme-roſe.* Sa chair eſt très-blanche, ſans marc, moins ferme & moins fine que celle du petit Api; ſon eau eſt abondante & aſſez agréable; quelques-uns croient y trouver un petit parfum de roſe; elle ſe conſerve long-tems: elle eſt de moyenne groſſeur, applatie & d'un gros rouge pourpré.

Malus fructu medio, compreſſo, ſature purpureo, inodoro, brumali.

*La Pommr étoilée*, ou *Pomme d'Etoile* eſt petite & a cinq angles; ſa couleur eſt mi-partie de jaune & d'un rouge jauniſſant; ſa chair ferme, un peu groſſiere; ſon eau tient un peu du ſauvageon: le plus grand mérite de cette Pomme eſt de ſe conſerver juſqu'en Juin.

Malus fructu parvo, Pentagono, partim luteo, partim e rubro flaveſcente, ſerotino.

*La Reinette grise.* Sa forme eſt applatie, ſa chair eſt ferme, fine, d'un blanc jaune; elle abonde en eau ſucrée, relevée d'un acide très-fin & fort agréable, ce qui la fait regarder par pluſieurs comme la meilleure de toutes; elle ſe conſerve preſqu'auſſi long-tems que la Reinette franche.

Malus fructu magno, compreſſo, cinereo, acidulè-dulci, brumali.

*La Postophe d'hiver.* Quoique ſon eau ſoit moins relevée que celle des Reinettes, elle a cependant un aigrelet aſſez fin pour la rendre agréable: cette Pomme n'ayant que de bonnes qualités mérite d'être commune; elle ſe conſerve iuſqu'en Mai & ſouvent au-delà. Elle eſt groſſe, applatie, mais à côtes d'un rouge pourpré inégal.

Malus fructu magno, compreſſo, glabro, prominenter coſtato, hinc ſaturè, indè dilutè purpureo, ſerotino.

*La Reinette franche.* La chair de cette Pomme eſt ferme, blanche, jaunit un peu dans ſon déclin; ſon eau relevée, ſucrée & d'un goût très-agréable, la fait regarder comme la Reine des Pommes:

Malus fructu magno, acidè-dulci, ſerotino.

elle a de plus la qualité de ſe conſerver juſqu'aux nouvelles & commence à mûrir en Février.

On diſtingue pluſieurs variétés de Reinettes franches qui ne diffèrent que par leur forme ou couleur, comme la *Reinette rouſſe*, qui eſt un excellent fruit, d'un goût très-fin & bien relevé, ainſi nommée parce qu'elle eſt couverte de pluſieurs taches rouſſes.

Malus fructu magno, albido. glaciato.

*La Pomme de glace*, ou *Tranſparente*. Il ne la faut point manger trop mûre; à ſon point ſa chair eſt tendre, ſon eau abondante & relevée d'acidité, ce qui rend cette pomme très-bonne cuite ou ſéchée au four : lorſque ſa maturité eſt paſſée, ſa chair devient ferme, de couleur verdâtre & tranſparente.

Malus fructifera flore fugaci.

*La Pomme-Figue*. Ce Pommier intéreſſe plus la curioſité que l'économie; ſon fruit eſt de forme irréguliere, & ſa peau d'un vert jaunâtre lavée de rouge brun du côté du ſoleil : ſes fleurs raſſemblées en bouquet ſont couvertes dans toutes leurs parties de duvet; elles ſont dépourvues des pétales qui ſe voient dans toutes les autres, ce qui a fait dire que ce fruit ſe formoit ſans fleurs, comme on le penſoit auſſi alors de la Figue, dont les fleurs ſont intérieures, & répondent à chacun des grains qu'elle renferme.

---

*N. B.* Le ſieur Andrieux fournira ſans délai des principales ſortes de Pommes greffées ſur Paradis de différens âges, & fera greffer les autres ſi l'on ſouhaite ſur les demandes qui lui en ſeront faites.

Il eſpère auſſi offrir dans peu aux curieux des greffes & même des ſujets greffés de la monſtrueuſe Reinette de Canada, excellente à manger, & qui peſe entre une livre & cinq quarterons.

Il prie auſſi les Curieux de lui adreſſer chaque année dès l'automne, s'il eſt poſſible, l'état des arbres qu'ils ſouhaiteront avoir; ils ſeront plus certains d'être ſatisfaits ſur tous les articles.

FIN.

# INDEX

## C. à LINNÉ

## NOMINUM TRIVIALIUM.


Acer campestre, 27
Acer creticum, *ibid.*
Acer Monspessulanum, *ibid.*
Acer Platanoides, 20, 27.
Acer Pseudoplatanus, 20, 27.
Aconitum Napellus, 17.
Agrimonia Eupatorium, 25
Agrostemma Coronaria, 17
Agrostemma Githago, 24
Alcea rosca, 18
Allium ascalonicum, 3
Allium Cepa, 2, 3
Allium fistulosum, 3
Allium Porrum, 2
Allium sativum, 2
Allium schænoprasum, 3
Allium scorodoprasum, 2
Althæa officinalis, 25
Alyssum incanum, 16
Amaranthus caudatus, 18
Amaranthus tricolor, *ibid.*
Amaryliis Belladona, 13
Amaryllis Sarnienſis, *ibid.*
Ammi majus, 23
Amorpha fruticosa, 20
Amygdalus nana, 30
Anchusa officinalis, 23
Anemone coronaria, 17
Anemone Hepatica, 16
Anethum fœniculum, 7, 8, 23
Anethum graveolens, 23
Angelica Archangelica, 8, 23
Anthoxanthum odoratum, 19
Apium graveolens, 23
Apium graveolens dulce, 1, 7
Apium Petroselinum, 8
Artemisia Abrotanum, 15
Arthemisia Absinthium, 22
Arthemisia Dracunculns, 7
Arthemisia vulgaris, 22
Arundo Donax picta, 14
Asclepias Syriaca, 22
Asparagus officinalis, 3
Aster Amellus, 15
Aster chinensis, *ibid.*
Athamantha cretensis, 23
Atriplex halimus, 29
Atriplex hortensis, 4
Avena elatior, 19, 21
Avena flavescens, 19
Avena pratensis, 19
Avena sativa. 22

Baccharis halimifolia, 28
Berberis vulgaris, 24, 29.

Beta cicla alba, 4
Beta cicla viridis, *ibid.*
Beta vulgaris, 2
Beta vulgaris lutea, *ibid.*
Bignonia Catalpa, 26
Bignonia radicans, 29
Blitum capitatum, 18
Borago officinalis, 7, 23
Braſſica arvenſis, 22
Braſſica Eruca, 8
Braſſica Napus, 2, 24
Braſſica oleracea, 24
Braſſica oleracea botrytis, 4
Braſſica oleracea capitata, 3
Braſſica oleracea gongylodes, 4
Braſſica oleracea Napobraſſica, 4
Braſſica oleracea rubra, 3
Braſſica oleracea ſabauda, 4
Braſſica oleracea ſabellica, *ibid.*
Braſſica oleracea viridis, 3
Braſſica Rapa, 2, 21
Briza media, 19
Bubon macedonicum, 23
Buplevrum fruticoſum, 19, 30
Buxus ſemper virens arboreſcens, 31
Buxus ſemper virens ſuffruticoſa, 31

Calendula officinalis, 15
Campanula perſicifolia, 18
Campanula pyramidalis, *ibid.*
Campan. Rapunculus, 2, 8
Canna indica, *ibid.*
Cannabis ſativa gigantea, 22
Capſicum groſſum, 9, 23
Carpinus Betulus, 28
Carpinus Oſtrya, 28
Carthamus tinctorius, 22
Carum Carvi, 23
Catananche cærulea, 14
Celoſia criſtata, 18
Celtis auſtralis, 28
Centaurea Cyanus, 14
Centaurea moſchata, *ibid.*
Centaurea moſchata Amberboi, *ibid.*
Cercis Siliquaſtrum, 19, 26
Cheiranthus annuus, 16
Cheiranthus, Cheiri, *ibid.*
Cheiranthus incanus, *ibid.*
Chenopodium ambroſioides, 24
Chenopodium Scoparia, 18
Chryſanthemum coronarium, 15
Cicer arietinum. 5, 25
Cichorium Endivia, 7, 22
Cichorium Endivia latifolia, 7
Cichorium Intybus, 7
Ciclamen europeum, 15
Citrus Aurantium, 24
Citrus Aurantium, 24, 32
Citrus decumana, 32
Citrus medica, 24, 32
Citrus medica Limon, 32
Clematis Viticella, 29

Coix Lachryma Jobi, 14, 22
Colutea arboreſcens, 20, 27
Colutea fruteſcens, 18
Conium maculatum, 23
Convolvulus hederaceus, 15
Convolvulus tricolor, *ibid.*
Coreopſis tripteris minor, 15
Coriandrum ſativum, 23
Coriaria myrtifolia, 29
Cornus florida, 26
Cornus maſcula. *ibid.*
Coronilla Emerus, 29
Corylus Avellana, 28
Cratægus Aria, 27
Cratægus Azarolus, *ibid.*
Cratægus coccinea, *ibid.*
Cratægus Crus-galli, *ibid.*
Cratægus Oxyacantha, 20, 30
Cratægus torminalis, 27
Cratægus tomentoſa, 27
Crithmum maritimum, 7
Crocus ſativus officinalis, 13, 21
Crocus ſativus vernus, 13
Cucumis flexuoſus, 9
Cucumis Melo, 25
Cuc. Melo Saccharatus, 9
Cuc. Melo ſtriatus, *ibid.*
Cucumis Melo verrucoſus, 10
Cucumis Melo vulgaris, 9
Cucumis ſativus, 9, 25
Cucurbita citrullus, 10, 25
Cucurb. lagenaria, 10, 25
Cuc. lagenaria longa, 10
Cucurbita Melopepo, *ibid.*
Cucurbita ovifera, *ibid.*
Cucurbita Pepo americanus, *ibid.*
Cucurbita Pepo oblongus, 10, 25
Cucurbita Pepo rotundus, 10, 25
Cucurbita verrucoſa, 10
Cuminum Cyminum, 23
Cupreſſus ſempervirens, 20, 31
Cuſcuta europea, 24
Cynara Cardunculus, 3
Cynara ſcolymus, *ibid.*
Cynoſurus criſtatus, 19
Cytiſus hirſutus, 29
Cytiſus laburnum, 20, 27
Cytiſus ſeſſilifolius, 29

Daphne Cneorum, 29
Daphne Laureola, *ibid.*
Daphne Mezereum, *ibid.*
Daucus Carota, 1, 23
Delphinium Ajacis, 17
Delphinium Staphiſagria, 24
Dianthus barbatus, 17
Dianthus carthuſianorum latifolius, *ibid.*
Dianthus Caryophillus, 9 17, 24
Dianthus chinenſis, 17
Dictamnus albus, *ibid.*
Digitalis purpurea, 15
Dipſacus fullonum campeſtris, 22
Dracocephalum moldavica, 9, 16, 24

ERVUM Lens, 6
Eryſimum Barbarea, 16
Evonymus europeus latifolius, 27
Euphorbia Latyrus, 25

FAGUS ſilvatica, 20
Fragaria americana ananaſſa, 11
Frag. amer. coccinea, *ibid.*
Frag. amer. lucida, *ibid.*
Frag. amer. milleri, *ibid.*
Frag. amer. tincta, *ibid.*
Frag. chil. dioica, *ibid.*
Frag. chil. hermaphrodita, *ibid.*
Fragar. moſchata dioica, *ibid.*
Frag. moſch. hermaphrodita, *ibid.*
Frag. pratenſis anguloſa,
Frag. prat. Cæſalpini, *ibid.*
Ftag. prat. granuloſa, *ibid.*
Frag. prat. Linnæi, *ibid.*
Frag. prat. nigra, *ibid.*
Frag. prat. viridis, *ibid.*
Frag. prat. Vaillantii, *ibid.*
Frag. ſilveſtris efflagellis, 10
Frag. ſilv. minor, *ibid.*
Frag. ſilv. monophilla, *ibid.*
Frag. ſilv. multiplex, *ibid.*
Frag. ſilv. ſemperflorens, *ibid.*
Fraxinus excelſior, 20
Fraxinus Ornus, 26
Ftitillaria imperialis, 13

GERANIUM zonale, 17
Glycine Apios, 29
Glycine monoica, 18
Gnaphalium orientale, 15
Gomphrena globoſa, 18

HEDERA Helix, 24, 31
Hedera quinque-folia, 29
Hedyſarum coronarium, 18
Hedyſar. Onobrychis, 21
Helianthus annuus, 14
Heliant. multiflorus, *ibid.*
Helianthus tuberoſus, 1
Heliotropium peruvianum 16, 19, 32
Hemerocallis flava, 13
Hemerocallis fulva, *ibid.*
Heſperis matronalis, 16
Hibiſcus ſyriacus, 19, 29
Hippophae Rhamnoides, 29
Holcus Sorghum, 21
Hordeum diſtichum, 22
Hord. diſtich. nudum, 22
Humulus Lupulus, 25
Hyacinthus Muſcari, 14
Hyacinth. orientalis, *ibid.*
Hyoſcyamus niger, 23
Hypericum perforatum, 24

IBERIS ſemperflorens, 16, 32
Iberis ſempervirens, 16
Iberis umbellata, *ibid.*
Ilex Aquifolium, 31
Impatiens Balſamina, 8, 16
Impatiens noli tangere, 16
Inula Helenium, 22
Iris florentina, 12
Iris perſica, 13

Iris pumila, 12
Iris ſambucina, *ibid.*
Iris ſuſiana, *ibid*
Iris tuberoſa, *ibid.*
Iris variegata, *ibid.*
Iris Xiphium, *ibid.*
Iſatis tinctoria, 21

Jasminum fruticans, 28
Jaſmin. grandiflorum, 32
Jaſminum humile, 29
Jaſminum officinale, 28
Juniperus bermudiana, 31
Juniperus communis, 25
Juniperus Lycia, 31
Juniperus phænicea, *ibid.*
Juniperus Sabina, *ibid.*
Juniperus virginiana, *ibid.*

Lactuca ſativa, 7, 22
Lactuca ſativa capitata, 6
Lactuca ſativa romana, 7
Lamium album, 23
Lathyrus latifolius, 18
Lathyrus odoratus, *ibid.*
Latyrus ſativus, 5
Lavandula Spica, 8, 23
Lavatera arborea, 18
Laurus nobilis, 24, 30
Lepidium ſativum 7, 8
Liguſtrum vulgare, 20, 23, 28
Lithoſpermum officinale, 23
Lilium bulbiferum, 13
Lilium candidum, 13, 22
Lilium chalcedonicum, 13
Lilium Martagon, *ibid.*
Lilium pomponium, *ibid.*
Linum uſitatiſſimum, 22, 24
Lobelia Cardinalis, 19
Lobelia ſiphylitica, *ibid.*
Lolium perenne, 19, 21
Lonicera alpigena, 28
Lonicera Caprifolium, *ibid.*
Lonicera coerulea, *ibid.*
Lonicera nigra, *ibid.*
Lonicera Periclymenum, *ibid.*
Lonicera pyrenaica, *ibid.*
Lonicera ſempervirens, *ibid.*
Lonicera tatarica, *ibid.*
Lonicera Xyloſteum, *ibid.*
Lupinus albus, 25
Lupinus varius, 18
Lychnis Calcedonica, 17
Lychnis Floſcuculi, *ibid.*
Lychnis Viſcaria, *ibid.*
Lycium europeum, 28

Malva criſpa, 24
Malva rotundifolia, 25
Medicago lupulina, 21
Medicago ſativa, 21
Melia Azedarach, 32
Meliſſa officinalis, 23
Meſpilus Pyracantha, 20, 27
Mezembrianthemum cryſtallinum, 18
Mimoſa pernambucana, *ibid.*
Mimoſa pudica, *ibid.*
Mirabilis Jalapæ, *ibid.*
Mirablilis longiflora, *ibid.*
Moerhingia muſcoſa, 17
Momordica Elaterium, 9, 19, 25

Morus alba, 20, 28
Myagrum Sativum, 24
Myrthus communis, 26, 32

Narcissus albus, 13
Narciſſus Jonquilla, *ibid.*
Narciſſus orientalis, *ibid.*
Narciſſus poeticus, *ibid.*
Narciſſus Pſeudonarciſſus, 13
Narciſſus tajetta, *ibid.*
Nerium Oleander, 32
Nicotiana tabacum, 23
Nigella damaſcena, 17
Nigella ſativa, 9

Ocimum Baſilicum, 16, 24
Ocimum minimum, 16
Oeimum monachorum, 9, 16
Oenothera biennis, 18
Oeſculus Pavia, 27
Origanum Majorana, 8, 23
Oxalis Acetoſella, 8

Panicum italicum, 21, 22
Panic. miliaceum, 21, 22
Papaver Rhæas, 16
Papaver ſomniferum, *ibid.*
Papav. ſomnif. album, 24
Papav. ſomn. nigrum, *ibid.*
Paſſiflora coerulea, 17, 29
Paſſiflora incarnata, 29
Paſſiflora lutea, *ibid.*
Paſtinaca ſativa, 1
Paſtinaca ſilveſtris, 23
Phalaris arundinacea picta, 14
Phalar. canarienſis, 21, 22
Phaſeolus nanus, 5
Phaſeolus vulgaris, *ibid.*
Phaſ. vulg. coccineus, 18
Philadelphus coronarius, 29
Phillyrea anguſtifolia, 30
Phillyrea latifolia, *ibid.*
Phillyrea media, *ibid.*
Phleum pratenſe, 21
Phlox maculata, 15
Pinus Abies, 31
Pinus balſamea, *ibid.*
Pinus Cedrus, 20
Pinus Cembra, 31
Pinus Larix, *ibid.*
Pinus Picea, 20, 31
Pinus Pinæas, 20, 25, 31
Pinus ſilveſtris, 20, 31
Pinus tæda, 31
Piſum ſativum, 5
Piſ. ſat. quadratum, *ibid.*
Piſ. ſat. umbellatum, *ibid.*
Plantago Coronopus, 8
Plantago major, 24
Plantago major roſea, 18
Plantago Pſyllium, 24
Platanus occidentalis, 28
Platanus orientalis, 27
Pimpinella Aniſum, 8, 23
Poa anguſtifolia, 19
Poa capillaris, 21
Poa pratenſis, 19
Poa trivialis, *ibid.*
Poeonia officinalis fœmina, 24
Poeon. officin. maſcula, 24
Polemonium coeruleum, 15
Polyanthes tuberoſa, 14
Polygonum orientale. 18

Populus alba excelsior, 27
Populus balsamifera, *ibid.*
Populus heterophylla, *ibid.*
Populus latifolia, *ibid.*
Pop. nigra lombarica, *ibid.*
Portulaca oleracea, 8, 24
Poterium Sanguisorba, 21
Primula Auricula, 15
Primula veris, *ibid.*
Primula veris elatior, *ibid.*
Prunus Mahaleb, 27
Prunus Padus, *ibid.*
Punica Granatum, 32

Quercus Ilex, 20
Quercus Robur, 20, 25

Ranunculus asiaticus, 17
Raphanus sativus major, 2
Raphan. sat. oblongus, 2
Raph. sat. rotundus, *ibid.*
Reseda Luteola, 24
Rhamnus Alaternus, 31
Rhamnus infectorius, 25
Rhamnus Paliurus, 27
Rhus coriaria, 30
Rhus Cotinus, *ibid.*
Rhus glabrum, *ibid.*
Rhus toxicodendron, *ibid.*
Rhus Typhinum, 20, 30
Rhus Vernix, 30
Ricinus communis, 19, 25
Robinia Pseudo acacia, 20 27
Robinia villosa, 29
Rosa alba, 29
Rosa alpina, 30
Rosa bifera, *ibid.*
Rosa cinnamomea, 29
Rosa centifolia, 30
Rosa eglanteria, 29
Rosa lutea, 30
Rosa provincialis, *ibid.*
Rosmarinus officin. 8, 23
Rubia tinctorum, 22
Rubus fruticosus alpinus, 30
Rub. frut. multiplex, *ibid.*
Rubus idæus alpinus, 12
Rubus occidentalis, 30
Rudbeckia hirta, 14
Rumex acetosa, 4
Rumex acetosa latifolia, 4
Rumex Patientia, 24
Ruta graveolens, 24

Salix babilonica, 27
Salvia officinalis, 8
Salvia Sclarea, 23
Sambucus Ebulus, 23
Sambuc. nig. laciniata, 26
Samb. nigra variegata, 26
Sambucus nigra, 23
Sambucus racemosa, 26
Santolina Chamæ cyparissias, 15, 22
Satureia hortensis, 9
Scabiosa atropurpurea, 15
Scabiosa stellata, 15
Scandix Cerefolium, 7
Scandix odorata, 8
Scilla amena, 14
Scorzonera Hispanica, 1
Seseli tortuosum, 23
Silene Muscipula, 17
Sinapis nigra, 24
Sisymbrium Sophia, 24
Sium Sisarum, 1, 23
Solanum Lycopersicum, 9

Solanum melongena, 9
Solan. Pſeudo-capſicum, 19
Solanum tuberoſum, 1, 21
Sorbus aucuparia, 20, 27
Sorbus domeſtica, 20, 27
Spartium junceum, 20, 31
Spergula arvenſis, 21
Spinaria oleracea, 4
Spiræa crenata, 30
Spiræa hypericifolia, *ibid.*
Spiræa ſalicifolia, *ibid.*
Staphylæa pinnata, 27
Syringa perſica, 28
Syringa vulgaris, 19, 26

TAGETES erecta; 15
Tagetes palula, *ibid.*
Tamarix gallica, 30
Taxus baccata, 20
Thlaſpi campeſtre, 24
Thuya occidentalis, 20, 31
Thuya orientalis, 20, 31
Thymus vulgaris, 8, 24
Tilia americana, 26
Tilia europea, 20
Tilia europea latifolia, 26
Tragopogon porrifolium, 1
Trifolium melilotus cærulea, 25
Trifolium pratenſe, 21
Trigonella fœnum-grecum, 25
Triticum æſtivum palmatum, 22
Tropœolum majus, 8
Tropœolum minus, *ibid.*
Tulipa geſneriana, 13

ULEX europeus, 22
Ulmus campeſtris, 20
Ulmus campeſtris latifolia, 28
Urtica dioïca, 25
Urtica pilulifera, 25

VALERIANA locuſta oblonga, 7
Valeriana locuſta olitoria, 7
Valeriana rubra, 15
Verbena officinalis, 23
Viburnum Lantana, 28
Viburnum Lentago, *ibid.*
Viburnum Opulus, *ibid.*
Viburn. prunifolium, *ibid.*
Viburnum Tinus, 30
Vicia faba major, 6
Vicia faba minor, *ibid.*
Vicia ſativa alba, *ibid.*
Vinca minor, 30
Vinca roſea, 15
Viola odorata, 24
Viola odorata plena, 9
Vitex Agnus caſtus, 23, 29
Vitis quinquefolia, 29

XERANTHEMUM annuum, 14

ZEA MAYS, 9
Zinnia multiflora, 14

FINIS.